CORRELAÇÃO ENTRE A UMIDADE E TEMPERATURA SOBRE O AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA EM CORDEIROS CONFINADOS

MATHEUS JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA¹; ANDRESSA MIRANDA CHAVES²; VERLISE LUCENA ROQUE DA SILVA³; ALICE MUELLER⁴; JULIANA PEREIRA FONSECA²; ROGÉRIO FOLHA BERMUDES⁴

¹Universidade Federal de Pelotas, acadêmico de Medicina Veterinária1 – matheus.jose1@outlook.com.br

²Mestranda ppgz/FAEM

³Universidade Federal de Pelotas, acadêmica de Zootecnia

⁴Universidade Federal de Pelotas, acadêmica de Medicina Veterinária

⁵Universidade Federal de Pelotas, Zootecnia/FAEM – rogeiro.bermudes@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

Tendo-se como meta a maior rentabilidade e aproveitamento do potencial genético de ovinos, o confinamento em galpões surge como uma alternativa para se ter um ambiente com melhor controle do manejo para com estes animais (GOMES et al., 2018). Entretanto, para que haja o contínuo avanço da eficiência produtiva, deve-se resolver outras problemáticas, como o estresse térmico, o qual está correlacionado com o bem-estar animal (BRIDI, 2010).

Sendo os ovinos animais endotérmicos, dependem um gasto energético para manterem sua temperatura corpórea estável (ECKERT, 2000). Assim, quando saem de sua zona de termoneutralidade, tendem a sofrerem alterações fisiológicas, as quais mobilizam calorías para aumentar ou diminuir a troca de calor com o ambiente, de acordo com a necessidade (POLLI et al., 2020).

A importância destes fenômenos pode ser observada, na medida em que ocorre a piora do desempenho reprodutivo e ganho de peso, além das possíveis mudanças comportamentais, como o aumento da ingestão de água como forma normalizar sua temperatura (PANTOJA et al., 2017). Tudo isso acarretando a uma qualidade de vida que infringe o bem-estar animal e gera perdas econômicas para o produtor rural (BLANK et al, 2019).

Dentre os principais fatores ambientais que levam a estas alterações fisiológicas e comportamentais, pode-se destacar a umidade relativa do ar e a temperatura do local de confinamento (BORGES et al., 2018).

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo traçar uma relação entre estes dois fatores ambientais, a umidade relativa do ar e a temperatura do galpão, com o aumento do consumo de água por ovinos devido ao estresse térmico.

2. METODOLOGIA

O confinamento foi realizado na Agropecuária Rincão, situada no município do Capão do Leão/RS.

Foram utilizados 42 cordeiros machos castrados, provenientes de cruzamento Telexel, peso médio de $\pm 26,2$ kg, idade média de 50 dias. Na recepção dos animais na propriedade, esses foram brincados com números ordinários, esquilados pelo método de Tosquia Tally Hi e pesados.

Os animais foram distribuídos em 02 tratamentos, sendo dieta de alto grão mais feno (DAGF) e dieta de alto grão sem feno (DAG), onde cada tratamento possuía 03 repetições e cada repetição possuía 07 animais, totalizando 21 cordeiros. O período pré-experimental foi de 14 dias e 46 dias de experimento.

O consumo de água era mensurado diariamente de acordo com os litros que eram recolocados nos bebedouros. A medida era feita através da pesagem por balança digital, considerando densidade de 01 para 01. O acompanhamento da temperatura foi através de termohigrômetro posicionado na altura dos animais. A leitura era feita diariamente às 17hs com os valores máximos e mínimos de temperatura e umidade. A análise estatística foi realizada utilizando Anova (modelo linear).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o observado na tabela 1, todos os parâmetro avaliados para a realização deste trabalho tiveram seu coeficiente de variância abaixo de 0,15, sendo assim, um resultado representativo, uma vez que esta medida visa averiguar a homogeneidade dos resultados. Além disso, o valor de p se manteve abaixo de 0,05, indicando uma correlação positiva entre o estresse térmico e o aumento do consumo de água.

Tabela 1: Consumo de água com dieta de alto grão (DAG), Consumo de água com dieta de alto grão com adição de feno (DAGF), umidade relativa do ar (UM), temperatura do galpão (°C), desvio padrão (DV) e coeficiente de variação (CV)

	Média	DV	CV
DAG	4,55	0,56	0,124
DAGF	4,5	0,65	0,146
UM	64,2	8,27	0,128
°C	27,38	2,76	0,1009

Legenda: para DAG e DAGF os valores de p-value foram $\leq 0,05$

Em relação as médias demonstradas na tabela 1, notou-se que a zona de conforto térmico foi mantida, ou seja, com a temperatura do galpão estando entre 20 e 30°C e a umidade relativa do ar se mantendo entre 60 e 70% (BAÊTA e SOUSA, 2010). Sendo assim, observou-se aumentos discretos no consumo de água, como um dos parâmetros para a observação da presença do estresse térmico nos animais. Porém, ainda perceptíveis e relevantes, uma vez que se leva em consideração o bem estar dos animais e o desempenho produtivo dos mesmos (BORGES et al., 2018). Quando acima de sua zona de conforto térmico, seja por temperatura ou umidade, ocorrem dificuldades para se realizar a dissipação do calor. Neste momento, dentre outras respostas fisiológicas e comportamentais que o ovino apresenta, eles aumentam sua frequência respiratória como forma de tentar diminuir sua temperatura mediante um sistema evaporativo. Apesar de ser o mecanismo mais eficiente de termorregulação, o mesmo ocasiona perdas hídricas para o animal, levando-o a ter uma maior ingestão de água como forma compensatória (SCHMITT et al, 2019). Podendo variar de acordo com a severidade com que os mesmos se encontram.

Segundo um experimento realizado por Medeiros et al. (2019), aonde se viu correlacionar as variáveis ambientais e o bem estar de ovinos confinados, observou-se os mesmo resultados, nos quais a umidade e a temperatura do galpão influenciam no conforto dos animais e nas suas respostas fisiológicas e comportamentais. Reforçando, assim, os resultados que foram observados na realização do presente trabalho.

4. CONCLUSÕES

A partir do presente estudo apresentado, foi possível evidenciar a relação direta do estresse térmico, gerado por alterações na zona de conforto térmico e umidade relativa do ar, com o aumento da ingestão de água por ovinos, independentemente da dieta que lhes foram ofertada. Evidenciando-se, desta maneira, o quão importante e necessário é se ter um olhar mais apurado para estas questões, tanto para o maior conforto e bem-estar dos animais, quanto para a maior rentabilidade dos produtores.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES, J.O.; SILVA, A.P.V.; CARVALHO, R.A. Conforto térmico de ovinos da raça santa inês confinados com dietas contendo três níveis de inclusão de concentrado¹. **Boletim de Indústria Animal**, Nova Odessa, v75, p.1-7, 2018.

POLLI, V.A et al. Estresse térmico e o desempenho produtivo de ovinos: uma revisão. **Medicina Veterinária (UFRPE)**, Recife, v14, n.1, p. 38-47, 2020.

MEDEIROS, F.F.; SOUZA, B.B.; NASCIMENTO, F.S. Correlação entre variáveis ambientais e bem-estar de ovinos confinados. **Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia**, Palmas, anais 2019.

SCHMITT, C.I. et al. Conforto térmico em currais pré-abate de ovinos. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.5, n.11, p. 24199-24210, 2019.

BLANK, G.M.; BERNARDY, R.; POUHEY, M.T.F. Conforto térmico em um aprisco de confinamento, localizado no município de São Lourenço do Sul/RS. **Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade**, Pelotas, v.7, p. 1-6, 2019.

BRIDI, A.M. Efeitos do ambiente tropical sobre a produção animal. Disponível em: www.uel.br/pessoal/ambridi/Bioclimatologia_arquivos/EfeitosdoAmbienteTropical-sobreaProducaoAnimal.pdf. 2010. Acessado em: 27/set/2020.

GOMES, F.H.T. et al. Viabilidade econômico-financeira do confinamento de ovinos alimentados com rações contendo torta de mamona. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, Lages, v.17, n.3, p. 383-395, 2018.

PANTOJA, J.C. et al. Avaliação do conforto térmico para ovinos em exposição durante feira agropecuária de Santarém. **Revista Agroecossistemas**, [S.l.], v.9, n.2, p. 316-329, 2018.

ECKERT, R. **Fisiologia animal: mecanismos e adaptações**. 4a ed. São Paulo: Guanabara, 2000. 729p.

BAÊTA, F.C.; SOUZA, C.F. **Ambiência em edificações rurais: conforto animal**. Viçosa, MG: UFV, 2010. 269 p.