UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel
Programa de Pós-Graduação em Agronomia
Área de concentração: Fruticultura de Clima Temperado

Dissertação

**Cultivares de videiras submetidas aos sistemas de condução fio único e espaldeira na
região do Vale do Rio do Peixe – SC**

Thaysedo Amaral Aires

Pelotas, 2022

Thayse do Amaral Aires

Cultivares de videiras submetidas aos sistemas de condução fio único e espaldeira na região do Vale do Rio do Peixe - SC

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial a obtenção do título de Mestre em Ciências (área de conhecimento: Fruticultura de Clima Temperado).

Orientador:

Prof. Dr. Vagner Brasil Costa

Co-orientadores:

Dr. André Kulkamp de Souza

Prof. Dr. Marcelo Barbosa Malgarim

Pelotas, 2022

Thayse do Amaral Aires

Cultivares de videiras submetidas aos sistemas de condução fio
único e espaldeira na região do Vale do Rio do Peixe - SC

Data da defesa: 10 de agosto de 2022, às 13:30 horas.

Banca examinadora:

Prof. Dr. Vagner Brasil Costa (Orientador)
Doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas

Prof. Dr. Valdecir Carlos Ferri
Doutor em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Pelotas

---

Prof. Dr. Paulo Celso de Mello Farias
Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Rafael Lizandro Schumacher
Doutor em Enologia pela Universidade de Castilla-La Mancha

**Dedico este trabalho a Deus, aos meus pais,
a minha avó, ao meu esposo e a minha filha.**

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me conceder saúde e sabedoria para seguir sempre em frente. Obrigada por ser a minha força e o meu guia em todos os momentos. A ti, Senhor, toda honra e toda a glória.

Aos meus pais, Claudete e Rubens, pelo apoio e incentivo em todos os momentos da minha vida. Por acreditarem em mim, e não medirem esforços para a concretização dos meus sonhos. Sem vocês, nada seria possível. Amo vocês com amor eterno!

À minha avó, Maria, você é inspiração, equilíbrio e o meu porto seguro nos momentos de tribulação. Meu amor por você é infinito!

Ao meu esposo, Eduardo, sem você por perto os resultados não seriam os mesmos. Obrigada pelo companheirismo, apoio e amizade incondicional.

À minha filha, Louise, que chegou durante o meu mestrado trazendo alegria e amor incondicional. Obrigada por cada carinho e sorriso que me transmite forças para continuar. Amo-te!

Às colegas Izabel Nardello e Marines Kirinus que sempre transmitiram o seu saber com muito profissionalismo e paciência, dedicando inúmeras horas para sanar as minhas questões e me colocar na direção correta.

Ao Professor Doutor Vagner Brasil, pela sua orientação científica, desafios e estímulo. A sua crítica construtiva e oportuna, foi fundamental.

Ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia, área de Fruticultura de Clima Temperado e especialmente aos meus supervisores; Professor Dr. Marcelo Malgarim e ao Doutor André de Souza pelas suas posturas impecáveis e que se mantiveram ao meu lado diante das adversidades que o tema apresentava.

Aos funcionários da Epagri por toda a dedicação e suporte oferecidos.

À UFPel e ao órgão de financiamento, Capes, pela concessão da bolsa.

A todos, que de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho! O meu muito obrigada!

“Tudo posso naquele que me fortalece”

Filipenses 4.13

RESUMO

AIRES, Thayse do Amaral. **Cultivares de videiras submetidas aos sistemas de condução fio único e espaldeira na Região do Vale do Rio do Peixe - SC.** 2022.60 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022.

A escolha das cultivares e sistemas de condução faz parte das etapas mais importantes da implantação de um vinhedo e impactam em seu manejo, seja ele fitotécnico ou fitossanitário, com interferência na composição nutricional e equilíbrio de fatores vegetativos e produtivos das videiras. Com a carência de mão de obra para os manejos vitícolas, busca-se sistemas adaptados à mecanização e cultivares com melhor desempenho agrônomo. O objetivo desse estudo foi verificar o desempenho de diferentes cultivares de videiras americanas e híbridas conduzidas em espaldeira e fio único de vinhedo localizado no município de Videira, Santa Catarina, no ciclo de 2019/20. O vinhedo foi implantado em 2015, em espaçamento de 3,0 x 1,5 metros entre filas e entre plantas, com o uso do porta-enxerto VR 043-43. O delineamento compreendeu em um arranjo fatorial 2 x 5 (2 sistemas de condução e 5 cultivares) com quatro repetições, cada uma composta por quatro plantas. Os sistemas de condução foram espaldeira e fio único e as cultivares Isabel precoce, Concord clone 30, Bordô, BRS Carmem e BRS Magna. O sistema de condução em espaldeira apresenta maiores valores de radiação PAR, tanto na altura dos cachos como do dossel vegetativo em comparação ao fio único. A cultivar Bordô apresentou maior interceptação de radiação PAR na altura dos cachos e dossel em relação às demais cultivares estudadas, entretanto, o fio único apresentou sólidos solúveis abaixo do desejado e a acidez em ambos os sistemas foi baixa. Além disso, os valores de pH apresentaram-se elevados, principalmente para Bordô em espaldeira. A cultivar BRS Magna foi a mais produtiva, independente do sistema de condução. O índice de clorofila não foi influenciado quanto aos sistemas de condução e cultivares estudadas. O maior número de cachos, massa de cachos, produção e produtividade foram observados no sistema de condução fio único. Todas as cultivares e sistemas de condução ficaram dentro da faixa desejável para a relação sólidos solúveis/acidez. Conclui-se que para região do Vale do Rio do Peixe – SC o sistema de condução fio único apresentou melhor desempenho produtivo que a espaldeira, principalmente quando relacionado à cultivar BRS Magna, sendo uma alternativa mecanizável para região.

Palavras-Chave: *Vitis sp.*; mecanização; produção.

ABSTRACT

AIRES, Thayse do Amaral. **Cultivars of vines submitted to single wire and espalier conduction systems in the region of Vale do Rio do Peixe - SC.** 2022.60 p. Dissertation (Master's degree) - Graduate Program in Agronomy, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2022.

The choice of cultivars and management systems are part of the most important steps in the implementation of a vineyard and impact on its management, whether phytotechnical or phytosanitary, with interference in the nutritional composition and balance of vegetative and productive factors of the vines. With the lack of manpower for viticultural management, systems adapted to mechanization and cultivars with better agronomic performance are sought. The objective of this study was to verify the performance of different cultivars of American and hybrid vines conducted in espalier and single-thread vineyard located in the municipality of Videira, Santa Catarina, in the 2019/20 cycle. The vineyard was implanted in 2015, with a spacing of 3.0 x 1.5 meters between rows and between plants, using the VR 043-43 rootstock. conduction and 5 cultivars) with four replications, each one composed of four plants. The management systems were espalier and single thread and the cultivars Isabel precocious, Concord clone 30, Bordô, BRS Carmem and BRS Magna. The trellis conduction system presents higher values of PAR radiation, both in the height of the bunches and in the vegetative canopy compared to the single wire. The Bordo cultivar presented higher PAR radiation interception at the height of the bunches and canopy in relation to the other cultivars studied, however, the single strand presented soluble solids below the desired and the acidity in both systems was low. In addition, the pH values were shown to be high, especially for burgundy in espalier. The cultivar BRS Magna was the most productive, regardless of the management system. The chlorophyll index was not influenced by the conduction systems and cultivars studied. The highest number of bunches, bunch mass, production and productivity are observed in the single wire conduction system. All cultivars and management systems were within the desirable range for soluble solids/acidity ratio. It is concluded that for the region of Vale do Rio do Peixe - SC, the single wire conduction system presented better productive performance than the espalier, especially when related to the cultivar BRS Magna, being a mechanized alternative for the region.

Keywords: *Vitis sp.*; mechanization; production.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1.** Área experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira - SC (27°02'33.78"S, 51°08'08.77"O e 830 m de altitude).....30
- Figura 2.** Vinhedo em frutificação conduzido no sistema fio único na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20 31
- Figura 3.** Vinhedo em frutificação conduzido no sistema espaldeira na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.....32
- Figura 4.** Avaliação do índice de clorofila com equipamento Minolta SPAD-502 (método não destrutivo) em vinhedo experimental na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.....33
- Figura 5.** Refratômetro digital de bancada com compensação automática de temperatura QUIMIS® (Nova instruments, WYA -2S, Brazil) para determinação de sólidos solúveis (°Brix) no laboratório localizado nas dependências da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.....34
- Figura 6.** Equipamento netter Toledo, 8603, China, para determinações de acidez total (mEq.L^{-1}) no laboratório localizado nas dependências da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.....35
- Figura 7.** Umidade relativa do ar em porcentagem (%), temperatura média do ar em graus Celsius (°C), precipitação em milímetros (mm), radiação média em W/m^2 a cada dez dias, do mês de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 na estação meteorológica do Ciram/Epagri na Região do Vale do Rio do Peixe no município de Videira- SC..... 36

Figura 8. Produtividade (ton.ha^{-1}) de diferentes cultivares nos sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....41

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1.** Influência das cultivares de videiras e sistemas de condução sobre o índice de clorofila no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....37
- Tabela 2.** Radiação PAR expressa em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ na altura dos cachos em diferentes sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....38
- Tabela 3.** Radiação PAR expressa em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ do dossel em diferentes sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....40
- Tabela 4.** Número e massa dos cachos (g) por planta, e a produção (kg/planta) de diferentes cultivares nos sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....42
- Tabela 5.** Influência das cultivares de videiras e sistemas de condução sobre o potencial hidrogeniônico (pH) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....43
- Tabela 6.** Parâmetros físico-químicos das cultivares de videira nos sistemas de condução fio único (FU) e espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.....44

SUMÁRIO

RESUMO.....	7
ABSTRACT	7
1. INTRODUÇÃO	13
2. REVISÃO DE LITERATURA	15
3. CAPÍTULO 1 – Comportamento de videiras americanas e híbridas sobre diferentes sistemas de condução na região do Vale do Rio do Peixe – SC.....	27
3.1. Introdução	27
3.2. Material e métodos.....	29
3.3. Resultados e discussão.....	35
3.4. Conclusões.....	46
3.5. Considerações finais	47
4. REFERÊNCIAS.....	48

1. INTRODUÇÃO

Presente na maioria dos estados brasileiros, a viticultura tem demonstrado importantes transformações com novas cultivares, práticas e processos que consideram a sustentabilidade, diversificando e expandindo regiões. Entretanto, no Brasil, observa-se uma tendência de queda de cultivo. De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (2021) a América do Sul apresentou queda (-1,2%) na área de vinhedos entre 2019 e 2020, essa redução já é observada pelo quinto ano consecutivo. Em 2020, no Brasil, a área plantada com videiras foi de 74.826 ha, ou seja, 1,2% menor que 2019 (IBGE, 2020). Condições meteorológicas desfavoráveis podem justificar essa queda, causada pelo fenômeno El Niño e o alto regime pluviométrico em áreas de cultivo (OIV, 2021).

As videiras pertencem ao gênero *Vitis*, família *Vitaceae*. As *Vitis* possuem mais de 60 espécies, distribuídas nos continentes asiático, europeu e americano. A área total de vinhedos mundiais independente da finalidade (vinho, suco, uvas de mesa e passas) no ano de 2021, é estimada em 7,3 milhões de hectares, incluindo vinhedos jovens (OIV, 2021).

Dentre essas, a espécie que se destaca em cultivo no mundo é a *Vitis vinifera*, com grande número de cultivares para produção de vinho e uva de mesa. Em seguida, a espécie mais importante é a *Vitis labrusca* (USP, 2021).

Além da grande escala em produção de vinhos de qualidade, a produção de suco de uva tem sua maior concentração nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com variedades de uvas americanas *Vitis labrusca*, como as cultivares Isabelle Bordô, apreciadas por consumidores de vários países por seu sabor e aroma característicos (TERRA et al., 2001; CAMARGO; MAIA et al., 2004). Dentre as diversas variedades de videira destinadas para produção de suco, destacam-se a Isabel precoce, Concord Clone 30, Bordô, BRS Carmem e BRS Magna, muito cultivadas na Região do Vale do Rio do Peixe no estado de Santa Catarina.

A atual problemática é a carência de mão-de-obra no meio rural, o que justifica a substituição de trabalhadores rurais por máquinas. A dificuldade de contratação de trabalhadores rurais é cada vez mais crescente. Considerando a importância agrícola para a humanidade e o quanto vem sendo difícil manter o homem no campo, é necessária adaptação de sistemas de condução que

35 facilitem a utilização de processos mecânicos na cultura da videira, tentando
36 minimizar os custos e definir as cultivares mais adaptadas à cada sistema.

37 Levando em consideração que na viticultura a maior demanda de mão
38 de obra se concentra-se nas fases de poda e colheita e para que a prática se
39 mantenha economicamente viável, estudam-se sistemas de condução que
40 possibilitem a mecanização durante essas fases. O sistema influencia na
41 fisiologia da planta, na qualidade da uva, submetendo as plantas a diferentes
42 exposições à radiação solar, resultando em sua composição fenológica e
43 atividade antioxidante (HICKEY et al., 2018). Segundo estudo feito de desponete
44 semi-mecanizado no estado de Santa Catarina, com objetivo de redução dos
45 custos e otimização de mão de obra, a semi-mecanização para esta prática
46 reduziu os custos e otimizou o uso de mão de obra, resultando na realização
47 do manejo do desponete no momento fenológico mais adequado, além disso,
48 reduziu os custos de produção vitícola (WURZ et al. 2017).

49 O sistema de condução mais utilizado no país é o de latada ou pérgola,
50 que traz consigo a necessidade de mão de obra, esse sistema tem alto custo
51 de implantação e manutenção, dificultando o serviço do trabalhador por sua
52 posição horizontal que causa sombreamento, afetando negativamente a
53 qualidade das uvas por fatores de microclima e fertilidade das gemas. A
54 mecanização é capaz de proporcionar a redução significativa no tempo de
55 execução dos processos, possibilitando a poda e colheita no momento mais
56 adequado e reduzindo os custos. Como alternativa os sistemas de condução
57 mais adequados à mecanização são espaldeira e fio único.

58 De acordo com Queiroz-Voltan et al. (2011) nos principais países
59 produtores de vinho, a condução em espaldeira é amplamente utilizada na
60 formação de vinhedos de castas finas para vinho. A espaldeira apresenta boa
61 aeração e estruturas por fila independentes, o que possibilita a ampliação da
62 mesma. Em comparação com a latada, a espaldeira apresenta menor custo de
63 implantação (MIELE et al., 2003). Em estudos comparativos do sistema
64 espaldeira e lira, o teor de antocianinas monoméricas totais foi maior nas
65 amostras de uvas cultivadas em espaldeira (CHAVES et al., 2005).

66 O sistema fio único (“cordone líbero”, “single wire”) é considerado uma
67 condução muito simples em termos de estrutura de sustentação, podendo ser
68 totalmente mecanizado (CARPIO et al., 2008). A espaldeira e o fio único se

69 diferem apenas na altura e quantidade de fios. Na espaldeira são utilizados de
70 3 a 4 fios horizontais enquanto no fio único é apenas um, localizado a cerca de
71 1,8 metros do solo, servindo de suporte ao cordão permanente da planta, o que
72 gera necessidade de cultivares com ramos ascendentes ou semi-ascendentes
73 e boa fertilidade de gemas na base.

74 Os sistemas de condução fio único e espaldeira necessitam de ajustes
75 de manejo para se tornarem viáveis, por essa razão, serão testadas cinco
76 cultivares com o objetivo de atingir a melhor relação entre produção e
77 qualidade.

78 Neste contexto, realizou-se este trabalho com o objetivo de verificar a
79 resposta de diferentes cultivares de videiras americanas e híbridas conduzidas
80 em espaldeira e fio único quanto ao índice de clorofila, radiação PAR, número e
81 massa de cachos, produção e produtividade, pH e parâmetros físico-químicos
82 nas dependências da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
83 Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira – SC no ciclo de
84 2019/20.

85 **2. REVISÃO DA LITERATURA**

86 **2.1. Aspectos Históricos**

87 As regiões e períodos do início da domesticação das videiras no mundo
88 ainda são duvidosos. No entanto, a domesticação está relacionada à
89 descoberta do vinho (COELHO, 2010). De acordo com McGovern (2003) no
90 Irã, nos anos 7000 a 7400 a.C. foram encontradas as primeiras evidências do
91 processo de elaboração de vinhos. Enquanto na Geórgia e Turquia,
92 encontraram sementes de videiras domesticadas, segundo estudo, com cerca
93 de 8000 anos. A partir daí as sementes se estenderam-se por outras regiões
94 como Egito e Mesopotâmia. De acordo com registros arqueológicos e fósseis
95 a viticultura e elaboração de vinhos no Egito já existiam há 5000 ou 6000
96 anos, que equivale ao período Neolítico (REISCH; PRATT, 1996).

97 Conforme Coelho (2010) após o declínio do império romano houve uma
98 crise econômica sobre a Europa que retrocedeu a vitivinicultura, entretanto, a
99 igreja católica desempenhou forte papel restabelecendo a mesma, produzindo
100 vinhos para o sacramento e sustento de monges no século V. Outro
101 importante fato histórico foi o crescimento do islamismo no norte da África,

102 Espanha e Oriente Médio, tendo grande expressividade na expansão da
103 vitivinicultura. Em torno de 1500, missionários espanhóis e portugueses
104 introduziram sementes por todo mundo.

105 No Brasil, as videiras foram introduzidas primeiramente no estado de
106 São Paulo por Martim Afonso de Souza, em 1532. No ano de 1626, a videira
107 chegou ao estado do Rio Grande do Sul por Roque Gonzáles, mas as
108 condições climáticas do estado não eram propícia são cultivo de cultivares e.
109 No estado de Santa Catarina a viticultura só obteve sucesso com os
110 colonizadores italianos dos vales atlânticos, em 1875. Práticas racionais foram
111 introduzidas na década de 50 com José Cabral de Noronha e Menezes, entre
112 elas a poda, desbastes, tratamentos fitossanitários, utilização de fertilizantes,
113 entre outros (LEÃO; POSSÍDIO, 2000).

114 Um experimento foi instalado em 1963 na cidade de Mandacaru no
115 estado de Paraíba, com uma coleção de 160 cultivares de videiras com intuito
116 de obtenção de uvas frescas, uvas passas, sucos e vinhos (LEÃO;
117 POSSÍDIO, 2000). A partir de 1975, foram mantidas em Banco de
118 Germoplasma da Embrapa Semiárido, fato decisivo para transformação da
119 região (COELHO, 2010).

120 Enquanto isso, a história do suco de uva integral ainda não foi
121 descoberta ao certo. Entretanto, a sua origem é apontada sendo a Grécia e
122 Roma antiga. Louis Pasteur, químico que desenvolveu a pasteurização,
123 realizou estudos e passou a conservar suco de uva em sua forma integral. De
124 acordo com Marzarotto (2010), em 1869 nos Estados Unidos, foi preparado o
125 primeiro suco de uva e que foi processado pelo Dr. Thomas Welch, Dentista
126 em Vineland e que, juntamente com a sua família, trabalhava extraindo com
127 bolsas de pano e conservando em garrafas de vidro. Desta forma,
128 expandindo-se e abrindo as portas para o mercado de suco industrial.

129 No Brasil, a produção de suco de uva foi adotada em maior proporção
130 no sul do país, principalmente na Serra Gaúcha. Cidades como Bento
131 Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha e Garibaldi foram o marco no
132 mercado de sucos. A produção vem obtendo um crescimento anual, onde a
133 maioria dos sucos é produzida em sua forma integral e logo após vêm os

134 concentrados (LOPES et al.,2017).

135 **2.2. Viticultura mundial e brasileira**

136 Os países com as maiores áreas vitícolas são: Espanha, França, Itália,
137 China e Turquia. Sendo o Brasil o país 20º colocado em áreas cultivadas com
138 videiras (MELLO, 2012). Ainda conforme Mello (2012), nos últimos 20 anos
139 houve um decréscimo das áreas vitícolas, na contramão da produção de uvas
140 que aumentou. Ainda liderando essa cultura, o continente europeu vem
141 reduzindo a sua produção, enquanto que a Ásia está passando para o segundo
142 lugar como o maior continente de produção vitícola.

143 No Brasil, a viticultura tem importância social e econômica devido ao
144 impacto na geração de empregos, seja a produção destinada a uvas de mesa,
145 vinhos, espumantes, sucos de uva, destilados e vinagres (ZANUZ et al., 2015).
146 A produção de uvas de mesa, ou destinadas ao processamento e inclusive
147 para vinificação, seja em pequenas ou médias áreas de cultivo, contribui
148 (TERRA et al., 2001; CAMARGO; MAIA et al., 2004), na geração de empregos
149 e acrescenta positivamente na economia.

150 A diversidade no cultivo de videira no Brasil é o diferencial, pois há
151 distintas condições ambientais, sistemas de cultivos e grande variedade
152 genética (CAMARGO et al., 2011). No Rio Grande do Sul, mais precisamente
153 na região da serra, bioma Mata Atlântica, desde 1880, está concentrada a
154 maior produção de uvas e derivados desde a vinda dos imigrantes italianos
155 (NODARI et al., 2019).

156 **2.3. Viticultura no Vale do Rio dos Peixes – Santa Catarina**

157 Na região do alto Vale do Rio do Peixe está localizada a maior área
158 vitícola do estado de Santa Catarina, em torno de 80%, mantida em sua grande
159 parte com mão de obra familiar, com o cultivo destinado principalmente à
160 produção de vinhos e sucos. Sua topografia é acidentada e o clima úmido com
161 solos profundos. Essa região necessita de sistemas mais adequados à
162 mecanização. Assim como no Rio Grande do Sul, muitas vinícolas mantêm
163 tradições atreladas às suas origens (NODARI et al., 2017).

164 Atualmente, o suco de uva integral tem se destacado, principalmente

165 pelos benefícios atrelados à saúde e a qualidade de vida. Conforme estudo,
166 existem 12 razões para o consumo deste suco e são eles: Benefícios à saúde,
167 retardar o envelhecimento por ser uma bebida energética, sabor agradável,
168 qualidade do produto, confiança na marca, costume, preço, valor
169 nutricional/produto nutritivo, ingredientes utilizados, prazo de validade e país de
170 fabricação (BRITO et al., 2020). É notável que todo ano no Brasil um grande
171 incremento da produção e consumo, impulsionando a qualificação das plantas
172 em regiões tradicionais, sendo a maioria das uvas americanas e híbridas, as
173 quais são consideradas mais adequadas para produção de sucos. Há regiões
174 com grande potencial produtivo, sugerindo novos polos produtivos, como no
175 nordeste do Vale do São Francisco, centro-oeste do Mato Grosso e Goiás
176 (ZANUZ et al., 2015).

177 **2.4. Fenologia da videira**

178 A fenologia é um ramo da ecologia que estuda sobre as mudanças na
179 morfologia e das transformações que a cultura passa durante todo o seu ciclo
180 (BUSATO et al., 2013). A fenologia da planta é de grande importância para
181 tomar conhecimento das variações sofridas conforme as mudanças climáticas
182 do ambiente que as plantas são submetidas. Desta forma, é possível fazer uma
183 programação de manejo conforme duração de suas fases fonológicas. As
184 informações referentes à duração de cada período fenológicas são
185 importantes, podendo ser utilizadas para manejar e otimizar os recursos no
186 parreiral (MANDELLI et al., 2003).

187 Segundo Mattar et al. (2016), a fenologia está relacionada com diversos
188 fatores climáticos, tais como: A temperatura, radiação solar e o comprimento do
189 dia. A pluviosidade, radiação solar e temperatura do ar, são consideradas
190 algumas das principais variáveis do clima que afetam o desenvolvimento das
191 plantas (VIEIRA; CARVALHO et al., 2009). Não apenas as características
192 climáticas, mas também os diferentes genótipos podem influenciar na
193 fenologia, sendo que um mesmo genótipo pode variar de acordo com a data
194 em que a planta foi podada (BARBOSA JÚNIOR et al., 2011).

195 Dependendo do estágio que a planta se encontra, é possível fazer um
196 planejamento de manejo e controle de doenças de forma antecipada e

197 considerando sobre os fatores climáticos. Além disso, é possível realizar a
198 aplicação de fungicidas nos vinhedos com base no estágio fenológico fixo da
199 planta, juntamente com o conhecimento do regime pluviométrico. Isso abre a
200 possibilidade de até 40% de redução do número de pulverizações (PEDRO
201 JÚNIOR et al., 1999).

202 **2.5. Cultivares**

203 **2.5.1. Isabel Precoce**

204 Cultivar *Vitis labrusca* spp, desenvolvida por mutação somática
205 espontânea da cultivar Isabel resultou na Isabel Precoce, ambas matérias-
206 primas básicas do suco de uva no Brasil, que possuem as mesmas
207 características de sua cultivar de origem, mas com a maturação antecipada em
208 20 a 35 dias, de fácil adaptação aos diferentes climas, produtividade entre 25 a
209 30 t.ha-1 em cada safra. Apresenta cacho no formato cilindro-cônico, alado,
210 cheio, de peso médio 110 g, baga preta (mais intensa do que a da 'Isabel'),
211 forma original em média 17,2 cm de diâmetro e 18,7 cm de comprimento,
212 sendo destinadas a produção de vinho de mesa e de suco de uva.

213 **2.5.2. Concord Clone 30**

214 Após a seleção clonal da tradicional cultivar 'Concord', foi obtida a
215 Concord Clone 30, *Vitis labrusca* spp. Dado o seu comportamento muito
216 próximo ao da cultivar tradicional 'Concord', com diferença apenas quanto ao
217 ciclo produtivo, no caso, de 15 dias antes. Além desta característica, a cultivar
218 apresenta alta rusticidade, médio vigor e alta produtividade, ficando com 13-16
219 °Brix. Ideal para aumentar a fase reprodutiva e processamento no sul do Brasil,
220 além de ser recomendada para climas amenos e também para altitudes
221 elevadas em climas tropicais (RITSCHER et al., 2018).

222 **2.5.3. Bordô**

223 Cultivar *Vitis labrusca* spp., de cor intensa, muito utilizada na obtenção
224 de sucos e vinhos de coloração forte, que apresentam o aroma 'foxy',
225 apreciado por um nicho de brasileiros (CASTILHOS et al., 2016).A
226 nomenclatura varia conforme cada região brasileira. 'Bordô' no Rio Grande do
227 Sul e em Santa Catarina, 'Terci' no Paraná e 'Folha de Figo' em Minas Gerais.
228 Sendo uma cultivar de uva comercialmente importante em regiões com inverno

229 definido, na contramão de climas tropicais que apresenta dificuldade de
230 crescimento, o que restringe seu cultivo aos polos do Sul de Minas Gerais e
231 Norte do Paraná. Nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
232 considerada rústica e resistente às doenças causadas por fungos (MAIA et al.,
233 2005).

234 **2.5.4. BRS Carmem**

235 De acordo com Ritschel et al. (2018), a cultivar BRS Carmem possui um
236 fruto de ciclo tardio, com bagas de coloração preta azuladas e sabor
237 aframboesado, onde o seu suco pode chegar até 19°Brix. Cultivar híbrida que
238 apresenta tolerância ao míldio, oídio, podridão cinzenta do cacho e
239 recomendada para a região da Serra Gaúcha e Norte do Paraná, para a
240 produção de sucos varietais ou da melhoria da cor.

241 **2.5.5. BRS Magna**

242 BRS Magna é o resultado do cruzamento entre 'BRS Rúbea' e 'IAC
243 1398-21' ("Traviú"), sendo uma cultivar híbrida. Possui seu sabor marcante,
244 típico de *Vitis labrusca* L., seu suco possui coloração violácea intensa, alto
245 conteúdo de açúcares e baixa acidez (RITSCHHEL et al., 2012). De ampla
246 adaptação aos diferentes climas, lançada como uma alternativa para a
247 melhoria da cor, da doçura e do sabor dos sucos de uva do país, apresentando
248 aproximadamente 18° Brix. Utilizada como alternativa em sucos de uvas com
249 deficiência de cor (RITSCHHEL et al., 2018).

250 **2.6. Sistemas de condução**

251 Nas videiras, o tipo de sistema de condução pode afetar
252 significativamente o crescimento da planta, produtividade do vinhedo e
253 qualidade da uva, do vinho e do suco (MIELE et al., 2005). As plantas se
254 adaptam a uma grande diversidade arquitetônica, não somente do dossel
255 vegetativo, mas também das suas partes perenes, sendo a distribuição
256 espacial do dossel, tronco e ramos, juntamente coma densidade das plantas e
257 orientação das linhas de plantio. Fatores estes que fazem parte do sistema de
258 condução e que em determinado ambiente, permitem a regulagem e a resposta
259 fisiológica para chegar ao destino final, seja uva de consumo in natura, para
260 elaboração de vinhos e de outros derivados (NORBERTO et al., 2006).

261 O sistema de condução em espaldeira é um dos sistemas mais
262 utilizados para plantas trepadeiras: São plantadas em sentido vertical, em
263 fileiras paralelas (RAMOS et al., 2018). Neste sistema são utilizados de 3 a 4
264 fios de sustentação horizontalizados.

265 O sistema de fio único (“cordone líbero”, “single wire”), é uma forma de
266 estrutura simples e que oferece a possibilidade de mecanização integralmente
267 (CARPIO et al., 2008). No fio único utiliza-se apenas um fio de sustentação,
268 localizado a aproximadamente 1,8m do solo, dispondo de sua copa totalmente
269 sem sustentação.

270 Os sistemas espaldeira e fio único são totalmente mecanizáveis,
271 acompanhando a viticultura moderna em todo o mundo, que valoriza a
272 qualidade e de redução de custos, onde isso induz ao interesse do setor
273 produtivo e desta forma influenciando na pesquisa(SOUZA et al., 2017). Os
274 postes de sustentação do sistema podem ser de madeira, concreto ou de aço
275 galvanizado furado, com fios lisos de sustentação das plantas. Com postes e
276 fios presos por sapatas e esticados por catracas. Os postes internos
277 normalmente são espaçados em 6 m e nas extremidades das filas é utilizado
278 um poste reforçado.

279 **2.7. Mecanização de Vinhedos**

280 A mecanização dos vinhedos surge como substituição da mão de obra, a
281 qual se encontra em carência. Nos últimos anos, a mecanização tomou maior
282 proporção, inclusive no Rio Grande do Sul e onde pequenas propriedades
283 sistematizaram as suas áreas de encosta possibilitando a pulverização
284 mecânica (CAMARGO et al., 2011). A mecanização é uma prática que se faz
285 necessária especialmente para a redução de custos (BARTSCH et al., 2010).

286 De acordo com Camargo et al. (2011), no caso de vinhedos de castas
287 finas para produção de vinho, o sistema de condução em espaldeira está
288 sendo utilizado afim de mecanizar podas, colheitas e pulverizações. Em
289 crescimento, a colheita mecanizada de vinhedos é uma opção mais econômica,
290 porém necessita de condições de relevo para a prática. Assim sendo,se
291 desenvolve uma colheita rápida e eficiente, com bom rendimento e substituição
292 do trabalhador (RODRIGUES, 2015).

293 A diminuição da disponibilidade e aumento do custo de mão-de-obra tem
294 aumentado o interesse de produtores em sistemas mecanizados de cultivo
295 (MORRIS et al., 2009). Algumas etapas do sistema de cultivo já apresentaram
296 avanços neste sentido, como o uso de tratores, pulverizadores e roçadeiras,
297 por exemplo. Porém, uma das atividades que mais demanda trabalho e que
298 necessita ser feita em um momento específico para obter êxito é a poda. Essa
299 ação é ainda realizada de forma manual em grande parte dos vinhedos, do
300 nosso país.

301 Devido à concentração e da falta de mão de obra necessária para
302 efetuar-la, os produtores se obrigam a antecipar o seu início e finalizar esta
303 prática em uma época desaconselhada. A poda realizada antecipadamente é
304 prejudicial para a planta, pois ela fica suscetível à ocorrência de geadas
305 tardias, já que ocorre um estímulo para brotação precoce das plantas. O uso de
306 poda mecanizada propicia uma redução no tempo necessário para essa
307 prática, fazendo com que ela possa ser realizada no período mais adequado.

308 **2.7.1. Pré-poda**

309 A mecanização na pré - poda das videiras, já é uma realidade para
310 alguns produtores. Esse manejo é realizado aproximadamente 30 dias
311 antecedentes à poda com o intuito de facilitar a mesma, ou seja, uma limpeza
312 inicial removendo ramos mais velhos da videira. Com a pré-poda realizada no
313 pomar, tem-se a facilidade de não acumular trabalho na poda.

314 Deve-se aguardar a queda natural das folhas da videira e só após essa
315 fase, deve-se realizar a pré-poda conforme a variedade, enfatizando que
316 normalmente o ideal é o mês de junho, para a realização desse manejo.

317

318 **2.7.2. Poda**

319 A prática de poda juntamente com a colheita em um vinhedo, está
320 relacionada com o sistema de condução da videira e são as atividades que
321 mais necessitam de mão de obra, refletindo diretamente na produção e no
322 crescimento vegetativo equilibrado (SOUZA et al., 2017). Para definir o tipo de
323 poda, é necessário conhecer a fertilidade das gemas (WÜRZ et al., 2019).
324 Dessa forma, para que haja um crescimento na relação de gemas da videira

325 utiliza-se a poda como alternativa de aumento de produtividade (WÜRZ et al.,
326 2019). Esse manejo reflete na fertilidade das gemas, isso por que a poda tem
327 a capacidade de baixar a fertilidade de gemas basais, necessitando de um
328 sistema de poda longa ou mista (WÜRZ et al., 2019).

329 A poda traz a diminuição dos custos de produção e a mão de obra
330 disponível, como fatores determinantes (SOUZA et al., 2017). É possível a
331 redução de 50% do total de custos de mão de obra quando se adota a poda
332 mecânica (PONI et al., 2004). Para adoção da poda mecânica é necessário
333 que a topografia da região seja ideal para mecanização.

334 Existe também a possibilidade da semi-mecanização, utilizada por
335 Würz et al. (2018), na prática de desponte das videiras realizada com um
336 podador mecânico acoplado à plataforma em um trator. Isso resultou em
337 redução de custo na produção e no desponte, otimizando a mão de obra e
338 que permitiu a prática no momento fenológico adequado. Independente de
339 gemas frutíferas ou vegetativas, a poda realizada no ano anterior exerce muita
340 influência nesse aspecto (ANTONIO et al., 2007). Então, o tipo de poda é
341 baseado no número de gemas deixadas nos ramos das plantas. Um dos
342 principais aspectos na produção é o número de cachos, este pode ser
343 determinado pela poda e da fertilidade de gemas (ANTONIO et al., 2007).

344 **2.7.2.1. Tipos de poda**

345 Conforme Panceri et al. (2018), uma poda manejada adequadamente,
346 resulta em produções constantes e cachos de qualidade superior. No caso de
347 variedades de videiras com gemas basais férteis, assim como as apicais, é
348 recomendada a utilização de poda curta, porém, em plantas cujas gemas
349 latentes sejam de fertilidade superior na região mediana dos sarmentos, é
350 recomendada a poda longa ou poda mista (MENDONÇA et al., 2016).

351 A poda curta é muito utilizada em sistema espaldeira, em plantas de
352 porte menor e com baixo vigor, objetivando a baixa produção e maior qualidade
353 de frutos (REYNOLDS et al., 2009). No caso de podas longas, são mantidos
354 esporões e varas nos dois lados, ou seja, duplo ou em um lado da videira,
355 entretanto, simples (HIDALGO et al., 2003). Entretanto a poda mista é baseada
356 na alteração da poda nos ramos, realizando poda curta com esporões, com a

357 finalidade de formar varas e netos para o próximo ciclo e uma poda do tipo
358 longa, mantendo varas e netos para uma máxima produção de cachos (SILVA
359 et al., 2018).

360 A poda é uma das operações que mais tempo consome no manejo
361 vitícola. De acordo com Intriери e Poni (1995), na Itália a porcentagem de mão-
362 de-obra associada à poda é de cerca de 36% das necessidades totais. As
363 práticas mais exigentes em mão de obra são a poda e colheita, estando
364 diretamente ligadas ao sistema de condução, afetando o equilíbrio do
365 crescimento vegetativo e produtivo (SOUZA et al., 2017).

366 Diversos estudos foram e estão sendo realizados em todo o mundo com
367 resultados promissores. De acordo com Keller et al. (2004), plantas de
368 'Concord' (*Vitis labrusca*) podadas mecanicamente, apresentam rendimentos
369 mais elevados e qualidade de uva semelhante às podadas manualmente.
370 Apesar da poda mecânica permitir maiores rendimentos nos primeiros anos,
371 observa-se uma menor diferença nos anos seguintes, demonstrando a
372 capacidade de adaptação das plantas a esta técnica (KELLER et al., 2004;
373 ZABADAL et al., 2002).

374 A mecanização da poda pode ser observada segundo duas
375 perspectivas: parcial e total. A primeira, também conhecida como pré-poda,
376 necessita acabamento manual com tesouras; e na total enquadram-se os
377 sistemas de poda sem correção ou repasse manual (CAMILO, 2009).

378 **2.7.3. Desfolha**

379 Desfolha é a remoção das folhas que estão sobre os cachos ou em
380 contato com eles, com potencial causador de danos devido ao atrito (LEÃO;
381 LACOURT, 2009). Conforme Giovaninni (2008), aspectos do dossel
382 vegetativo são influenciados pela desfolha. Os objetivos desse manejo são o
383 aumento da temperatura, radiação solar e aeração nos cachos influenciando
384 na coloração e maturação de bagas e reduzindo a incidência das podridões
385 para uma melhor qualidade (POTTER et al., 2010). Outro objetivo da desfolha,
386 é a de realizar um equilíbrio entre o número de folhas e de frutos.

387 Existem desfolhadoras importadas e nacionais, sendo as nacionais com
388 custo reduzido em comparação aos equipamentos importados, que acabam

389 sendo mais onerosos. Uma desfolhadora tem ajustes para realizar desfolha
390 drástica ou leve, havendo uma flexibilidade para utilização. Uma desfolha
391 mecânica é realizada no máximo quando a baga apresenta um pequeno
392 tamanho, isso para não haver danos aos cachos.

393 **2.7.4. Colheita**

394 A importância da mecanização na vindima é justificada pela escassez
395 de mão de obra no setor, sendo atualmente uma das principais razões para
396 sustentabilidade competitiva no cultivo das videiras pelos agricultores
397 (VIDEIRAS, 2021). Conforme Rodrigues (2015), a colheita mecanizada vem
398 substituindo a mão de obra manual, e por ser mais econômica vem tomando
399 maior proporção nas regiões de cultivo dos vinhedos, que possuem relevo
400 adequado para tal prática. Sendo assim, a colheita é feita mais rapidamente e
401 eficiente, resultando em um maior rendimento no processo. Por outro lado, a
402 mão de obra não é totalmente substituível. É necessário que antes da colheita
403 mecânica, haja a remoção de cachos não desejados (FONSECA, 2015).

404 A colheita mecânica não pode ter uma menor eficiência que a manual,
405 mantendo a mesma proporção e qualidade das bagas. Esses frutos devem
406 manter os parâmetros de qualidade conforme a legislação, isso para que a
407 indústria mantenha um padrão dos produtos elaborados (VIDEIRAS, 2021). O
408 que se tem hoje disponível no mercado são as colheitadeiras autopropelidas,
409 de chassi montado e puxadas por trator, sendo a última menos onerosa e que
410 mantém uma boa qualidade de colheita.

411 **2.8. Suco de uva integral**

412 O suco de uva integral é aquele que em sua concentração e composição
413 natural apresenta-se límpido ou turvo e não sendo permitida a adição de
414 açúcar (RIZZON et al., 2007). A cada safra assim como o vinho, após as uvas
415 serem processadas, origina-se um suco diferenciado, resultando na qualidade
416 e características de cada ano (BRUCH et al., 2012). Conforme Copello et al.,
417 (2017), o consumo in natura e da produção de suco, estão entre os principais
418 destinos das uvas.

419 Para avaliar a qualidade do suco, são necessárias avaliações físico-

420 químicas e sensoriais. De acordo com Bresolin et al. (2013), não basta apenas
421 a utilização de um método eficiente para extrair o suco, as características do
422 bom rendimento de mosto, relação doçura e acidez, maturação e sanidade são
423 parâmetros que dependem da variedade de uva e que estão diretamente
424 ligadas a um sabor agradável ao consumo. A análise sensorial tem como papel
425 a aceitação do consumidor aos produtos (VILLANUEVA et al., 2005).

426 No Brasil, predominam as variedades do grupo *Vitis labrusca* para
427 elaboração de suco, especialmente Isabel, Bordô e Concord (BRESOLIN et al.,
428 2013). Segundo Oliveira et al. (2010), é de grande importância as avaliações
429 físico-química das uvas, onde essa questão acaba possibilitando sobre a
430 verificação se o produto é de qualidade e também se este se encontra dentro
431 da legislação.

432 **3. CAPÍTULO 1 – Comportamento de videiras americanas e híbridas**
433 **sobre diferentes sistemas de condução na região do Vale do Rio do**
434 **Peixe - SC**

435 **3.1. Introdução**

436 Embora a viticultura seja encontrada em todo estado de Santa Catarina,
437 a região do Alto Vale do Rio do Peixe se destaca-se por ser a de maior
438 produção. Ocupando o primeiro lugar em processamento de uvas no ano de
439 2018, o município de Pinheiro Preto, superou 14 milhões de quilos e isso
440 significa 42,4% de participação estadual. Em segundo lugar, vem o município
441 de Videira com mais de 7 milhões de quilos, o equivalente a 22,7% de
442 participação (CEPA, 2018).

443 Para a produção de suco na região, tem-se como destaque a cultivar
444 Isabel, que é responsável pela maior produção da bebida brasileira e isso
445 porque possui grande disponibilidade de matéria prima. Entretanto, qualquer
446 variedade de uva pode ser utilizada para a produção de suco e desde que
447 tenha obtido a maturação adequada (BENDER et al., 2020). Potencialmente
448 importante na produção de suco, destacam-se as cultivares Isabel Precoce,
449 Concord Clone 30, Bordô, BRS Magna e BRS Carmem (CAMARGO; MAIA;
450 RITSCHHEL, 2015).

451 Existem diversos tipos de sistemas de condução para a produção
452 vitícola mundial, sendo, que no sul do Brasil, os sistemas de condução mais
453 utilizados são do tipo latada, espaldeira e Y ou manjedoura. Em regiões
454 tradicionais, no cultivo de cultivares americanas para mesa, utiliza-se em maior
455 proporção o sistema espaldeira baixa, que gradativamente vem sendo
456 substituído pelos sistemas manjedoura e latada por apresentarem maior
457 produção (HERNANDES et al., 2019). Entretanto, existem sistemas com
458 características similares ou com princípios semelhantes (MIRANDA et al.,
459 2020). Devido à escassez de mão-de-obra para os manejos vitícolas, surgiu a
460 necessidade de estudar sobre os sistemas de condução que permitem a
461 mecanização. Tem-se investido em pesquisas com sistema de condução fio
462 único, do qual possui apenas um fio duplo que sustenta a copa e o sistema
463 espaldeira, onde os 3 a 4 fios são dispostos na posição horizontal para a
464 distribuição do dossel (SOUZA et al., 2017).

465 As folhas da videira possuem pigmentação verde, da qual absorve a

466 radiação luminosa, chamada de clorofila. O nitrogênio tem participação na
467 formação das clorofilas, que se localizam no mesófilo de células foliares (TAIZ;
468 ZEIGER, 2008). Diretamente envolvida na fotossíntese, as clorofilas são
469 produzidas em abundância, concomitantemente com os pigmentos acessórios:
470 Os carotenóide e ficobilinas (STREIT et al., 2005). Quando o dossel é muito
471 denso, acaba dificultando a exposição das folhas à luz do sol e isso pode
472 interferir na taxa fotossintética (WURZ et al., 2021). Presentes nos vegetais
473 verdes, nas formas *a* e *b*, as clorofilas são sintetizadas e destruídas, sendo os
474 processos influenciados por fatores internos e externos às plantas
475 (BLANKENSHIP, 2009). O crescimento e adaptação das videiras estão ligados
476 a eficiência fotossintética e isso justifica a importância do índice de clorofila nas
477 folhas.

478 Ainda relacionado ao processo de fotossíntese, a radiação solar é a
479 única fonte de alimentação de energia com a capacidade de suprir os
480 processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem nas plantas, convertendo a
481 energia radiante em energia química nas folhas, armazenado pela planta
482 através da fotossíntese (ALMEIDA, 1999). O maior componente da radiação
483 solar global incidente é a radiação fotossinteticamente ativa, que é a propagada
484 pela atmosfera praticamente sem sofrer redução por absorção, podendo
485 chegar a 50% do espectro (PEREIRA; ANGELOCI; SENTELHAS, 2002). A
486 radiação fotossinteticamente ativa ou PAR (do inglês – Photosynthetically Active
487 Radiation), é uma parte do espectro da radiação solar global, ficando entre os
488 comprimentos de ondas 0,4 a 0,7 μm (FINCH et al., 2004). É na radiação PAR
489 que ocorre a excitação das moléculas de clorofila, sendo a primeira etapa para
490 iniciar o fluxo de energia necessária para o processo fotossintético e isso
491 justifica a importância da radiação PAR para a viticultura (MCCREE, 1972).

492 Conforme a lei nº 7678 (1988), o suco é definido como bebida não
493 fermentada, oriunda do processo tecnológico, a partir da fruta sã e madura,
494 sendo o suco integral composto por 100% da fruta enquanto o concentrado é
495 parcialmente desidratado e o adoçado podendo conter 10% de açúcar.
496 Pensando em qualidade das uvas, é importante uma composição físico-
497 química equilibrada que depende de diversos fatores como, por exemplo: A
498 poda, cultivar e sistemas de condução. O teor de constituintes como sólidos
499 solúveis e ácidos orgânicos presentes nas sementes e polpas, são

500 influenciados conforme o desenvolvimento dos frutos e repercutem nas
501 características sensoriais e físico-químicas das bagas (FERRER-GALLEGO et
502 al., 2010).

503 Neste contexto, realizou-se este trabalho com o objetivo de verificar a
504 resposta de diferentes cultivares de videiras americanas e híbridas conduzidas
505 em espaldeira e fio único. Foram avaliados o número de cachos, massa de
506 cachos, produção, produtividade, índice de clorofila, pH, características físico-
507 químicas e radiação PAR nas dependências da Empresa de Pesquisa
508 Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no
509 município de Videira – SC no ciclo 2019/20.

510 **3.2. Material e métodos**

511 O estudo foi realizado na área experimental da Empresa de Pesquisa
512 Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no
513 município de Videira - SC (27°02'33.78"S, 51°08'08.77"O e 830 m de altitude),
514 no ciclo 2019/20. Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, a
515 região apresenta um Nitossolo Bruno Distróficos (SANTOS et al., 2013), a
516 textura é argilosa com paisagem moderadamente plana a levemente ondulada
517 (SURVEY STAFF, 1999). De acordo com a escala de Köppen (1931), o
518 município de Videira é classificado como Cfb, ou seja, clima temperado
519 propriamente dito, com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18°C
520 (mesotérmico), verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo
521 de 22°C e sem estação seca definida.

Figura 1. Área experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira - SC (27°02'33.78"S, 51°08'08.77"O e 830 m de altitude).

Fonte: Google Earth

522 A instalação do vinhedo foi realizada no mês de agosto de 2015, em
523 local pré-definido considerando o histórico da área, facilidade de mecanização,
524 exposição solar, das características físicas e de textura de solo. A adubação foi
525 baseada em análise do solo e realizada conforme a recomendação para a
526 cultura da videira (COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC, 2004).

527 Foram realizadas covas sobre os camalhões utilizando o espaçamento
528 de 3 m entre as linhas de plantio e de 1,5 m entre as plantas para fazer o
529 plantio das mudas. Utilizou-se bordadura com plantas nas cabeceiras e nas
530 linhas.

531 O experimento foi realizado sob o delineamento de parcela subdividida,
532 em arranjo fatorial 2 x 5 (2 sistemas de condução, 5 cultivares) com quatro
533 repetições, sendo que cada uma foi composta por quatro plantas. As parcelas
534 foram compostas pelos dois sistemas de condução e as sub-parcelas pelas
535 diferentes cultivares.

536 As cultivares utilizadas foram: a) Isabel Precoce; b) Concord Clone 30; c)
537 Bordô; d) BRS Carmem; e) BRS Magna. A escolha foi baseada em cultivares
538 com área cultivada significativa na região ou em suas aptidões como a matéria-
539 prima na elaboração de sucos integrais. O porta-enxerto utilizado foi o VR043-
540 43, originado do cruzamento entre *V. rotundifolia* x *V. vinifera*, que apresenta
541 tolerância à pérola-da-terra e fusarioseque sendo muito utilizado na região.

542 Foram utilizados dois sistemas de condução: a) espaldeira e b) fio único.
543 Os quais foram instalados com postes de aço galvanizado furados, com a
544 finalidade de instalar o fio liso de sustentação das plantas. Os postes e os fios
545 foram presos por rabichos e esticados por catracas. Os postes internos foram
546 espaçados em 6 metros e nas extremidades das filas, foi utilizado um poste
547 duplo reforçado. A espaldeira se diferencia no número e na altura dos fios
548 sendo 4 alturas de fios; o primeiro (único e fixo) situado 1,0 m do solo; o 2º
549 (duplo e móvel) a 0,20 m do primeiro; o 3º (duplo e móvel) a 0,20 m do
550 segundo; e o 4º (duplo e móvel) a 0,20 m do terceiro. A fim de facilitar a
551 condução de novas brotações, foram utilizados fios duplos móveis, para que
552 possam ser levantados conforme a necessidade das plantas e até atingir 1,8 m.
553 No fio único, o mesmo foi colocado a 1,8 metros do solo e será fixo.

Figura 2. Vinhedo em frutificação conduzido no sistema fio único na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.

Figura 3. Vinhedo em frutificação conduzido no sistema espaldeira na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.

554 A poda utilizada foi do tipo mista. Utilizando uma roçadeira costal com o
555 objetivo de simular o corte realizado por uma máquina especializada em poda.
556 A definição da altura do corte foi baseada na distância entre nós de cada
557 cultivar, sendo que permaneceram em cada ramo em média três gemas
558 (esporões). Ao decorrer, foi realizado um repasse manual retirando-se alguns
559 dos esporões, de modo a permanecer 10 esporões com 3 gemas por planta.

560 Os dados diários de temperatura média em °C, média da umidade
561 relativa do ar (%), radiação média (W/m²) e soma diária de precipitação (mm),
562 foram registrados na estação meteorológica automática da Epagri/Ciram
563 (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidro - Meteorologia de
564 Santa Catarina), localizada ao lado da área experimental. Os dados de
565 temperatura, umidade relativa, radiação e precipitação foram resumidos, pela
566 média, a valores decendiais no período de setembro de 2019 a fevereiro de
567 2020 e utilizados para a composição dos gráficos de temperaturas médias,
568 média da umidade relativa, radiação média e precipitação.

569 Para determinação do índice de clorofila, foram realizadas análises na
570 primeira quinzena de janeiro de 2020 (ciclo produtivo) com auxílio do
571 equipamento Konica Minolta SPAD-502 (método não destrutivo). Fornecendo
572 leituras da clorofila a partir da quantidade luminosa transmitida pela folha nos
573 comprimentos de onda 650 nm e 940 nm e da absorção luminosa pela clorofila

574 (SWIADER; MOORE, 2002). A leitura foi realizada diretamente na planta na
575 região central do limbo foliar em duas folhas por parcela, sendo utilizada a
576 média das duas leituras para representar os tratamentos.

Figura 4. Avaliação do índice de clorofila com equipamento Minolta SPAD-502 (método não destrutivo) em vinhedo experimental na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.

577

578 Para a realização das leituras de radiação PAR (fotossinteticamente
579 ativa), utilizou-se o equipamento Quantum Flux Apogee que apresenta as suas
580 leituras em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ (TOBERGTE; CURTIS, 2013). As leituras de radiação
581 PAR dos tratamentos foram feitas concomitantemente às 09h00 (H1), às 12h00
582 (H2) e às 15h00 (H3). As medidas foram realizadas em duas alturas, sendo
583 elas: Nível dos cachos e nível do dossel com o sensor voltado para cima, a fim
584 de verificar a radiação interceptada. A leitura foi realizada em duas plantas por
585 parcela e posteriormente calculadas as médias.

586 Quando atingiram a maturação tecnológica indicada por coloração visual
587 e teor de sólidos solúveis mínimo de 16° Brix, os frutos foram colhidos. As
588 variedades BRS Magna, Concord Clone 30, Bordô e Isabel Precoce colhidas
589 na segunda quinzena de janeiro de 2020 e BRS Carmem na segunda quinzena
590 de fevereiro de 2020. No momento da colheita, as variáveis avaliadas foram o
591 número de cachos e a massa dos cachos (g), que foi determinada por meio da
592 pesagem dos cachos colhidos através de uma balança digital portátil
593 (Micheleth®); Adicionalmente determinada à produtividade estimada por quilos
594 por hectare com base na densidade de plantio. A massa média dos cachos foi

595 obtida pela relação entre massa da produção total da planta e o número de
596 cachos por planta.

597 Para os parâmetros físico-químicos foram retirados 20 cachos por
598 parcela e por meio da extração do mosto realizado por esmagamento das
599 bagas avaliou-se o teor de sólidos solúveis, determinado em refratômetro
600 digital de bancada com compensação automática de temperatura QUIMIS®
601 (Nova Instruments, WYA -2S, Brasil) e o resultado expresso em °Brix. O pH foi
602 determinado diretamente no mosto por pHmetro Meter AD1030 e as
603 determinações de acidez total foram realizadas por titulação da amostra (netter
604 Toledo, 8603, China), com solução padronizada de NaOH 0,1N, adotando-se,
605 como ponto final da titulação o pH = 8,2, e o resultado expresso em mEq.L⁻¹
606 (IAL, 2008).

Figura 5. Refratômetro digital de bancada com compensação automática de temperatura QUIMIS® (Nova instruments, WYA -2S, Brazil) para determinação de sólidos solúveis (°Brix) no laboratório localizado nas dependências da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.

Figura 6. Equipamento netter Toledo, 8603, China, para determinações de acidez total (mEq.L^{-1}) no laboratório localizado nas dependências da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), localizada no município de Videira/SC no ciclo de 2019/20.

607

608 O delineamento experimental foi completamente casualizado em um
609 esquema bifatorial onde o Fator A é composto pelas cinco cultivares, sendo
610 elas: A Bordo, BRS Carmem, BRS Magna, Concord Clone 30 e Isabel Precoce,
611 e o Fator B pelos dois sistemas de condução a espaldeira e o fio único.

612 Os dados foram analisados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-
613 Wilk e quanto à homocedasticidade pelo teste de Hartley. Posteriormente, os
614 dados foram submetidos à análise de variância ($p \leq 0,05$). Para a interpretação
615 dos resultados e determinação da significância das médias foi comparada pelo
616 teste de Tukey ($p \leq 0,05$), utilizando o software computacional R para Windows.

617 **3.3. Resultados e discussão**

618 O ciclo de 2019/20 apresentou baixa precipitação e temperaturas altas,
619 principalmente na segunda quinzena de dezembro. Além disso, demonstrou
620 radiação solar mais elevada e a menor porcentagem de umidade relativa neste
621 mesmo período. Dados de temperatura média, umidade relativa do ar, radiação
622 solar e precipitação do ciclo de 2019/20 estão descritos na Figura 1.

Figura 7: Umidade relativa do ar em porcentagem (%), temperatura média do ar em graus Celsius (°C), precipitação em milímetros (mm), radiação média em W/m² a cada dez dias, do mês de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 na estação meteorológica do Ciram/Epagri na Região do Vale do Rio do Peixe no município de Videira – SC.

623 De acordo com Bender et al. (2021), cultivares americanas são de maior
624 facilidade de cultivo por apresentarem rusticidade e resistirem às doenças e
625 pragas, tolerando melhor a alta umidade relativa do ar. A temperatura é um
626 dos principais fatores que influenciam na fertilidade de gemas das videiras.
627 As cultivares americanas necessitam de temperaturas entre 21 a 22 °C ,
628 baixas em relação às *Vitis viniferas*, por exemplo (MULLINS et al. 2000). A
629 maior umidade foi observada em novembro, onde normalmente é nesse
630 período que ocorre o estágio fenológico, que vai da plena floração até a
631 mudança de cor, que juntamente com a alta umidade, favorecendo a
632 incidência de fungos e reduzindo a produtividade. Neste estudo, a baixa
633 precipitação e as temperaturas mais elevadas, ocorreram em dezembro,
634 período que compreende entre mudança de cor até a colheita. Conforme Gil
635 e Psczolkwsky (2007), quanto maior o número de dias sem a ocorrência de
636 precipitações, ocorre automaticamente, a diminuição da disponibilidade de
637 água do solo, o que afeta a frutificação, o crescimento e reduz a taxa de
638 desenvolvimento dos frutos pela redução na transpiração celular. Os
639 maiores índices de radiação solar também foram observados em dezembro,

640 mais precisamente na segunda quinzena. Conforme Keller (2020), a luz do
 641 sol afeta a luz incidente e a temperatura dos diferentes tecidos das plantas,
 642 sendo em alguns casos, a temperatura ambiental diferente da temperatura
 643 dos tecidos (BENDER et al., 2021). O tempo de duração de cada porção do
 644 ciclo fenológico da videira, pode afetar a fase seguinte quanto ao teor de
 645 açúcar das bagas. Ou seja: A duração de todo o ciclo está relacionada com
 646 o tempo que a planta tem para fotossintetizar os açúcares, podendo resultar
 647 na qualidade dos frutos (JONES; DAVIS, 2000).

648 Na avaliação do índice de clorofila, não foram constatadas diferenças
 649 significativas entre os sistemas e as cultivares, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Influência das cultivares de videiras e sistemas de condução sobre o índice de clorofila no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

	Clorofila	
	Fio Único	Espaldeira
Bordô	37,80 ^{ns}	33,48 ^{ns}
BRS Carmem	39,21	34,61
BRS Magna	39,42	34,68
Concord Clone 30	45,32	40,37
Isabel Precoce	38,8	40,78
CV (%)		15,52
Sistema de Condução		3,10 ^{ns}
Cultivares	<i>FValue</i>	1,87 ^{ns}
Sistema de Condução x Cultivares		0,50 ^{ns}

Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; *F Value*: análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente

650 As características dos sistemas de condução vitícolas podem aumentar a
 651 produtividade das plantas e também a qualidade dos frutos, em maior ou
 652 menor escala (NORBERTO et al., 2009). Além disso, apesar de não haver
 653 interação, percebemos que o índice de clorofila apresentou maiores valores no
 654 sistema fio único, com exceção apenas da cultivar Isabel Precoce. Os menores
 655 valores de clorofilas podem ser em decorrência das diferentes constituições
 656 genéticas das cultivares, o que pode justificar o comportamento da cultivar
 657 Bordô. Conforme Yuan et al. (2016), os clorofilômetros são grandemente
 658 influenciados pela região específica da folha que foi feita a medição, isso
 659 porque a clorofila não é distribuída de forma uniforme ao longo da lâmina foliar.
 660 Amarante et. al. (2009), ao realizar um experimento com videiras utilizando o

661 equipamento SPAD-502, o mesmo deste trabalho, e o Minolta CR-400, para
 662 determinação do índice de clorofila. Estes autores consideraram que em função
 663 das clorofilas absorverem quantidades de luz incidente, a medição da
 664 quantidade de radiação absorvida pela folha com o SPAD-502, resultaria em
 665 melhor estimativa de clorofilas do que a medição da luz refletida pela superfície
 666 da folha, obtida com o Minolta CR-400. Entretanto, constatou-se que eles
 667 apresentam resultados similares para quantificar o índice de clorofilas nas
 668 folhas, o que demonstra a eficiência do equipamento utilizado neste estudo.

669 Para radiação PAR interceptada na altura dos cachos, foram observadas
 670 interações entre cultivares em H2 (12:00 horas) e H3 (15:00 horas). Entretanto,
 671 as médias não apresentaram diferenças significativas. O sistema de condução
 672 espaldeira demonstra maior radiação que o fio único em H1 (09:00 horas),
 673 como descrito na Tabela 2.

674 **Tabela 2.** Radiação PAR expressa em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ na altura dos cachos em
 675 diferentes sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp)
 676 no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

677

	Cacho H1	Cacho H2	Cacho H3	Média
Bordo	278,5 ^{ns}	278,3a	198,6a	251,7 ^{ns}
BRS Carmem	107,7	189,5ab	77,0b	124,73
BRS Magna	229,2	88,3b	100,1ab	139,2
Concord Clone 30	139,5	139,8ab	88,7ab	122,7
Isabel Precoce	161,2	247,7a	86,5ab	165,1
Fio único	86,5B	216,5	94,5	132,5
Espaldeira	280,0A	160,9	125,8	188,94
CV (%)	82,62	113,05	66,42	62,27
Sistema ^F	16,35*	0,68 ^{ns}	1,83 ^{ns}	3,18 ^{ns}
Cultivar ^F	1,68 ^{ns}	1,05*	3,75*	2,30 ^{ns}
Sistema x Cultivar ^F	0,99 ^{ns}	1,09 ^{ns}	0,78 ^{ns}	1,16 ^{ns}

H1 – 09:00 horas; H2 – 12:00 horas; H3 – 15:00 horas. Médias seguidas da mesma letra minúscula estabelecem relação entre as cultivares e maiúscula relação entre os sistemas de condução, ambas na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; ^F: F Valueda análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente.

678 Na altura dos cachos independente do sistema de condução, a maior
 679 radiação foi em H2 na cultivar Bordô, se diferenciando-se apenas da BRS
 680 Magna que apresentou baixa radiação. Em H3, a cultivar Bordô também
 681 apresentou o maior valor em relação às demais. Mesmo que sem diferença
 682 estatística em H1 e na média, esta cultivar também demonstrou os maiores
 683 valores de radiação. Essa radiação PAR que chega à altura das frutificações,

684 possibilita vários efeitos, destacando a sua relação com a qualidade luminosa,
685 principalmente a ultravioleta, que é a responsável pela estimulação da
686 produção de compostos ligados na determinação de características produtivas
687 de biomassa da parte aérea vegetativa e dos frutos de videira (GRIFONI et al.,
688 2008).

689 Em H1, o sistema fio único apresentou radiação inferior em relação ao
690 espaldeira, e isso é justificado pela arquitetura do dossel e posição solar. O
691 sistema espaldeira se localiza a noroeste da área, recebendo maior radiação
692 que o fio único que está a sudoeste. Além disso, o sistema fio único gera maior
693 sombreamento na região dos cachos, devido ao seu dossel proporcionar maior
694 adensamento de ramos e das folhas lateralmente recebendo maior radiação
695 quando o sol está diretamente acima das plantas. Como os ramos deste
696 sistema se distribuem em maior concentração nas laterais. Por não serem
697 tutorados, recebem maior radiação do zênite solar. De acordo com Würz, et al.
698 (2019), quanto mais adensado é o dossel da videira, menor a interceptação de
699 radiação fotossinteticamente ativa. A melhor interceptação de radiação na
700 altura dos cachos, resulta nos maiores teores de sólidos solúveis. Quanto mais
701 exposta à região dos cachos à radiação solar, maior será o acúmulo de sólidos
702 solúveis. Ou seja: Maiores serão os teores de açúcares nas bagas, quanto
703 maior for à intensidade de radiação solar incidente (TEIXEIRA, 2004).

704 Para radiação PAR no dossel vegetativo, se observa-se interação
705 apenas entre os sistemas de condução em H1, onde, a espaldeira apresenta
706 maior radiação que o fio único (Tabela 3).

Tabela 3. Radiação PAR expressa em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ do dossel em diferentes sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

	Dossel H1	Dossel H2	Dossel H3	Média
Bordo	1449,4 ^{ns}	2229,7 ^{ns}	631,1 ^{ns}	1437,3 ^{ns}
BRS Carmem	1122,9	2225,7	566,4	1303,3
BRS Magna	1181,7	2199,1	540,3	1307,1
Concord Clone 30	1416,1	2181,4	605,8	1322,1
Isabel Precoce	1515,6	2237,1	559,0	1401,1
Fio Único	1179,4 ^B	2198,4 ^{ns}	614,7 ^{ns}	1330,8 ^{ns}
Espaldeira	1494,9 ^a	2230,8	546,4	1423,4
CV (%)	32,42	4,22	39,03	11,21
Sistema ^F	5,3 [*]	1,21 ^{ns}	0,97 ^{ns}	3,59 ^{ns}
Cultivar ^F	1,28 ^{ns}	0,50 ^{ns}	0,22 ^{ns}	1,52 ^{ns}
Sistema x Cultivar ^F	0,50 ^{ns}	0,75 ^{ns}	0,14 ^{ns}	0,54 ^{ns}

H1 – 09:00 horas; H2 – 12:00 horas; H3 – 15:00 horas. Médias seguidas da mesma letra minúscula estabelecem relação entre as cultivares e maiúscula relação entre os sistemas de condução, ambas na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; ^F: *F* Valueda análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente

707 Quando analisamos as médias das cultivares na Tabela 2, mesmo que
 708 sem interação, a Bordô mantém o comportamento da Tabela 1. Conforme
 709 Nachtigal e Schneider (2007), a cultivar Bordo apresenta vigor moderado, ou
 710 seja, menor vigor em relação às demais. Consequentemente, observa-se um
 711 menor número de folhas, reduzindo o adensamento, o sombreamento nas
 712 bagas e interceptando de forma mais eficiente a radiação no dossel e nos
 713 cachos. Quanto aos sistemas de condução, foi observado o mesmo
 714 desempenho de quando analisados na altura dos cachos, e onde o sistema de
 715 condução espaldeira em H1 demonstra maior radiação. O que confirma este
 716 resultado é a distribuição vegetativa da espaldeira que fica na posição vertical,
 717 interceptando com maior eficiência a radiação solar, pois tanto ao nascer do sol
 718 (leste) até o pôr do sol (oeste), a planta e os cachos neste sistema recebem
 719 radiação PAR. Em estudo realizado no município de São Joaquim/SC, com
 720 videiras conduzidas em espaldeira em sentido norte-sul, perceberam que elas
 721 recebem radiação solar durante todo decorrer do dia (GUIMARÃES et al.,
 722 2013).

723 Em relação à produtividade (Figura 2), a cultivar BRS Magna demonstra
 724 ser a mais produtiva, independente do sistema de condução. Em contrapartida,
 725 “Concord Clone 30”, independente do sistema de condução, demonstra ser a
 726 de menor produção. As variedades Bordô e Concord Clone 30 apresentaram

727 maior produção no sistema fio único (Figura 2)

Figura 8: Produtividade (toneladas/hectare) de diferentes cultivares nos sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

FU – Fio único; Esp – Espaldeira. Médias seguidas da mesma letra minúscula estabelecem relação entre as cultivares e maiúscula entre os sistemas de condução, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; *F Value*: análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente

728 Já era esperada uma menor produtividade no sistema espaldeira em
 729 relação ao fio único, pois ela exige tutoramento, impingindo a estas plantas
 730 uma menor quantidade de ramos. Na Figura 2 observa-se uma maior
 731 produtividade de todas as cultivares testadas no sistema de condução fio único.
 732 Isso por que não necessita de tutoramento, produzindo um maior número de
 733 ramos e de cachos, tornando-se mais vantajoso por apresentar um menor
 734 custo de implantação e ser totalmente mecanizável (SOUZA et al. 2017). Ainda
 735 conforme estudo realizado pelo autor, a cultivar BRS Magna demonstrou a
 736 maior produtividade e produção por planta no sistema fio único, em relação ao
 737 espaldeira comparando as mesmas cultivares deste estudo.

738 Foram constatadas interações para número de cachos e produção por
 739 planta entre os sistemas e cultivares. Não foi observada interação entre os
 740 sistemas de condução para o parâmetro massa dos cachos. Entretanto,
 741 observam-se diferenças entre os cultivares no sistema espaldeira,
 742 demonstradas na Tabela 4.

Tabela 4. Número e massa dos cachos, e a produção (Kg/planta) de diferentes cultivares nos sistemas de condução, sendo o fio único (FU) e a espaldeira (Esp) no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

	Nº de cachos/planta		Produção Kg/planta		Massa dos cachos G	
	FU	Esp	FU	Esp	FU	Esp
Bordo	52Aabc	19Bb	4,5Aab	1,2Bb	80Aa	60Abc
BRS Carmem	29Ac	35Aab	5,1Aab	3,8Aab	180Aa	110Aab
BRS Magna	55Aab	47Aa	7,6Aa	6,9Aa	130Aa	160Aa
Concord Clone 30	42Abc	19Bb	3,3Ab	1,0Bb	80Aa	50Ac
Isabel Precoce	67Aa	51Aa	6,3Aab	4,9Aa	90Aa	100Aab
CV (%)	35,68		48,76		36,03	
Sistema ^F	19,13**		13,74*		3,23 ^{ns}	
Cultivar ^F	12,23**		14,23**		14,98**	
Sistema x Cultivar ^F	4,12**		2,52*		2,78*	

FU – Fio único; Esp – Espaldeira. Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; ^F: F Value da análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente

743 O sistema fio único apresenta maior número de cachos, com exceção da
 744 cultivar BRS Carmem que apresentou maior número no sistema espaldeira.
 745 Entretanto, a produção desta cultivar foi a mais elevada no fio único, justificada
 746 pelo peso que os cachos apresentaram. Conforme Norberto et al. (2008), a
 747 produção de videiras nos diferentes sistemas de condução pode gerar uma
 748 produção de frutos em maior ou menor escala produtiva. O mesmo observado
 749 neste trabalho quanto ao peso dos cachos, é confirmado por Souza et al.
 750 (2017), que quando compararam os mesmos sistemas de condução e
 751 cultivares, em que o fio único apresentou a massa média dos cachos com
 752 valores superiores. Desta forma, uma melhor performance das variedades
 753 estudadas a este sistema, formando cachos de maior tamanho, considerado
 754 referência em qualidade de cachos. A cultivar BRS Magna, em ambos os
 755 sistemas, se destacou por ultrapassar 6 kg por planta. Esta cultivar, demonstra
 756 uma boa fertilidade de gemas, sendo a sua produtividade acontecendo nos
 757 estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e que pode chegar a
 758 30 toneladas por hectare (RITSCHER et al., 2012). O sistema espaldeira
 759 apresenta uma baixa produção por planta nas cultivares Bordô e Concord
 760 Clone 30, condizente com o baixo número de cachos apresentados por estas
 761 plantas. Em fio único ‘BRS Carmem’ apresenta o maior peso e a ‘Concord
 762 Clone 30’ o menor peso por cacho. É esperado que o sistema fio único,
 763 apresente maior quantidade de ramos e cachos, isso porque este sistema de

764 condução, ao contrário da espaladeira, não necessita de tutoramento dos ramos
765 (SOUZA et al., 2017).

766 A Tabela 5 apresenta as médias entre as amostras de pH. Observam-se
767 diferenças entre as cultivares nos dois sistemas de condução. A cultivar Bordô
768 apresentou pH mais elevado no sistema de condução espaladeira.

Tabela 5. Influência das cultivares de videiras e sistemas de condução sobre o potencial hidrogeniônico (pH) do mosto das uvas no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

	Fio Único	Espaladeira
Bordo	3,61Bbc	5,13Aa
BRS Carmem	3,49Ac	3,50Ab
BRS Magna	3,77Aa	3,82Ab
Concord Clone 30	3,67Aab	3,65Ab
Isabel Precoce	3,63Aabc	3,59Ab
CV (%)		10,66
Sistema de Condução		5,64*
Cultivares	<i>FValue</i>	5,78*
Sistema de Condução x Cultivares		5.65*

Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; *F Value*: análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente

769 O valor mínimo de pH nos sucos de uva varia entre 3,00 e 3,10, nesse
770 contexto, quanto menor o pH, maior a facilidade de destruição térmica dos
771 micro-organismos (RIZZON; MENEGUZZO, 2007). Entretanto, observa-se que
772 nenhuma cultivar ficou dentro dessa faixa de pH. Conforme Bender et al.
773 (2019), o pH está relacionado às características gustativas dos sucos e pode
774 ser influenciado principalmente pela característica genética das diferentes
775 cultivares utilizadas. Considera-se uma possível causa dos altos valores de pH,
776 a podridão ácida de bagas observada no ciclo 2019/20 nas cultivares
777 estudadas, principalmente na Bordô.

778 Em trabalho realizado com a cultivar BRS Cora, onde a comparação foi
779 com os sistemas de condução espaladeira, lira e latada, os valores de pH das
780 amostras apresentadas foram elevados, variando entre 3,34 a 3,36 (ALMEIDA;
781 NUNES, 2018). No presente trabalho, os valores de pH demonstraram um valor
782 ainda maior, entre 3,49 e 5,13. Conforme Würz, et al. (2019), para a variável
783 pH, em três safras avaliadas (2011, 2012 e 2013) com a cultivar Cabernet
784 Sauvignon no município de Lages, Santa Catarina, os valores obtidos foram

785 superiores a 3,00 nos quatro sistemas de sustentação avaliados (GDC, latada
786 descontínua, espaldeira e cortina simples) que condizem com os resultados
787 deste trabalho. Quanto maior o valor do pH, maior o risco de ações oxidativas
788 enzimáticas (AERNI, 1985). Além do sistema de condução, outros fatores
789 podem afetar o pH: Como as concentrações de ácido tartárico da uva e de
790 minerais do solo, principalmente do potássio, adubação nitrogenada e também
791 da precipitação pluviométrica (MANFROI et al., 2006).

792 A Tabela 6 apresenta avaliações físico-químicas em que as cultivares no
793 sistema espaldeira demonstram melhor desempenho no teor de sólidos
794 solúveis, destacando as cultivares Bordô e Concord Clone 30 com valores
795 inferiores em fio único. No parâmetro acidez titulável, com exceção da BRS
796 Carmem, no fio único foram registrados os menores valores. Apenas a cultivar
797 Concord Clone 30 diferenciou-se quanto aos sistemas na acidez. Para a
798 relação sólidos solúveis/acidez, a Concord Clone 30 apresenta valor mais
799 elevado no sistema de condução de fio único. Dentre as cultivares estudadas,
800 Isabel precoce no fio único demonstra a maior relação e a menor é observada
801 na cultivar BRS Carmem em espaldeira.

Tabela 6. Parâmetros físico-químicos das cultivares de videira nos sistemas de condução fio único (FU) e espaldeira (Esp) sobre o mosto das uvas no ciclo de 2019/20 no Vale do Rio do Peixe – SC.

	FU	Esp	FU	Esp	FU	Esp
	SST °Brix		Acidez mEq L ⁻¹		Relação SS/AT	
Bordo	13,73Bb	14,65Ab	49,40Ab	49,83Ac	27,82Aab	29,97Aa
BRS Carmem	17,20Aa	17,33Aa	73,23Aa	73,19Aa	24,44Ab	23,79Ab
BRS Magna	16,65Aa	17,23Aa	59,10Aab	61,91Aabc	28,62Aab	27,84Aab
Concor Clone 30	16,65Ba	18,05Aa	55,80Bab	65,66Aab	30,49Aa	27,54Bab
Isabel Precoce	17,25Aa	17,67Aa	53,00Ab	59,12Abc	33,09Aa	30,55Aa
CV (%)		5,80		12,28		16,06
Sistema		4,89*		2,70 ^{ns}		0,43 ^{ns}
Cultivar	<i>F Value</i>	16,49**		10,98**		2,94*
Sistema x Cultivar		0,45 ^{ns}		0,64 ^{ns}		0,39 ^{ns}

FU – Fio único; Esp – Espaldeira; SS/AT – Sólidos solúveis/Acidez titulável. Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. CV: coeficiente de variância; *F Value*: análise de variância; ^{ns}: não significativo; *, **: significativo a 5 e 1% de probabilidade respectivamente

802 O maior valor de sólidos solúveis é da cultivar Concord clone 30 em

803 espaldeira. Além das características genéticas, é justificado por este sistema
804 ter uma menor produção em relação ao fio único (Tabela 3) e uma melhor
805 insolação nos cachos devido sua arquitetura, confirmado pelos resultados de
806 radiação PAR quanto aos sistemas de condução deste trabalho. Conforme
807 Instrução normativa nº 14, de 8 de fevereiro de 2018, o suco de uva deve
808 apresentar um teor mínimo de 14º Brix (BRASIL, 2018). Isso significa que com
809 exceção da Bordô no fio único, todas as outras cultivares, nos diferentes
810 sistemas obedecem a esse padrão. Um fator que pode afetar negativamente os
811 sólidos solúveis é a maturação dos frutos e como o sistema de condução fio
812 único tem uma maior produção e maior carga de folhas, conseqüentemente
813 maior sombreamento que o espaldeira, resultando em maior dificuldade de
814 amadurecimento dos frutos.

815 Conforme autor Chiarotti et al. (2011), a cultivar Bordô conduzida em
816 espaldeira, com manejo convencional, no município de Bocaiuva do Sul-PR,
817 apresentou deficiência de maturação, prejudicando o teor de sólidos solúveis
818 dos frutos, afetando negativamente o suco. O teor de sólidos solúveis aponta,
819 aproximadamente, a quantidade de açúcar que existe na baga e que é
820 transferido para o suco. O baixo valor de sólidos solúveis na Bordô pode ser
821 pela característica genética, pois de acordo com Camargo e Maia (2004), a
822 cultivar Bordô apresenta um teor de açúcar naturalmente muito baixo.

823 O padrão de acidez mínimo exigido para o suco de uva é de 55 mEq.L⁻¹,
824 sendo a Bordô, a única cultivar que não atende à exigência legislativa brasileira
825 que estabelece a complementação dos padrões de identidade e da qualidade
826 do vinho e derivados da uva (BRASIL, 2018). Isso porque, a bordô apresenta
827 uma película de maior espessura que as outras cultivares, podendo ser colhida
828 mais tarde, desta forma, atingindo um maior grau de maturação e enquanto as
829 outras precisam ser colhidas antecipadamente. Os frutos da bordô
830 amadurecem em períodos de precipitação nos estados do sul e do sudeste do
831 Brasil, afetando significativamente a qualidade das bagas. Por isso, a relação
832 sólidos e solúveis e acidez, não são suficientes para a produção de sucos de
833 qualidade, impedindo que se enquadre na legislação (CHIAROTTI et al., 2011).
834 Desta forma, parte da sua variância é explicada pelo fator variedade.
835 Entretanto, a cultivar Bordô apresenta uma coloração intensa e baixa acidez,
836 sendo muito utilizada em *blends* para incorporação de cor nos sucos. Assim

837 como a Bordô, a alta acidez da cultivar BRS Carmem, também é justificada por
838 características genéticas. Esta cultivar é de ciclo tardio e, por essa razão,
839 apresenta dificuldade de amadurecimento. Em trabalho realizado no Paraná,
840 com BRS Carmem submetida ao sistema espaldeira, foi observado um teor de
841 acidez acima do desejado. Entretanto, os sólidos solúveis e a relação entre os
842 parâmetros se mantiveram dentro do padrão para a elaboração de sucos
843 (SATO et al., 2021), sendo o mesmo encontrado neste trabalho. Ácidos
844 orgânicos como tartárico, cítrico e málico conferem acidez aos sucos,
845 resultando em baixo pH e garantindo o equilíbrio entre doçura e acidez
846 (RIZZON et al. 1998). A uva in natura possui compostos e concentra açúcares
847 e ácidos orgânicos, por fim, possibilitando a estabilização ao suco e da
848 qualidade organoléptica (BENDER, et al. 2019).

849 De acordo com Burin et al. (2010), a relação entre os sólidos solúveis e
850 acidez titulável, indicam a qualidade dos sucos, e os valores para esta relação
851 que devem variar entre 15 e 45. Choudhury (2001), refere-se que para um
852 equilíbrio entre os parâmetros SS/AT o valor seja igual ou superior a 20. Os
853 valores da relação obtidos neste trabalho, comportaram-se conforme citado
854 pelos autores Burin et al (2010) e Choudhury (2011). O maior valor observado
855 foi da cultivar Isabel Precoce, isso porque, ela apresentou elevado ° Brix e
856 baixa acidez. O segundo maior valor desta relação, foi na cultivar Concord
857 Clone 30 no sistema fio único, justificado pela menor acidez desta cultivar. O
858 comportamento oposto foi observado pela cultivar BRS Carmem, devido à sua
859 acidez elevada. Conforme Camargo et. al. (2010), *blends* de uvas com
860 diferentes concentrações de sólidos solúveis e de acidez total, apresentam
861 vantagens para a produção de sucos padronizados em relação a esses
862 parâmetros, influenciando nas características gustativas.

863 **3.4. Conclusões**

864 O índice de clorofila não foi influenciado quanto aos sistemas de
865 condução e cultivares estudadas.

866 O sistema de condução espaldeira, apresenta maiores valores de
867 radiação PAR, tanto na altura dos cachos como do dossel vegetativo, em
868 comparação ao fio único.

869 A cultivar Bordô, tem a maior interceptação de radiação PAR na
870 altura dos cachos e dossel em relação às demais cultivares estudadas.

871 O maior número de cachos, massa de cachos, produção e
872 produtividade são observados no sistema de condução fio único.

873 A cultivar BRS Magna foi a mais produtiva independente do sistema
874 de condução.

875 Os valores de pH foram elevados, principalmente para a cultivar
876 Bordô em espaldeira.

877 A cultivar Bordô em fio único, apresentou sólidos solúveis abaixo do
878 desejado e a acidez em ambos os sistemas foi baixa. Entretanto, todas as
879 cultivares ficaram dentro da faixa desejável para a relação sólidos
880 solúveis/acidez.

881 **3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

882 Com base nos resultados obtidos e as condições deste experimento, é
883 possível considerar que o sistema de condução de fio único (mesmo recebendo
884 uma menor radiação PAR), é uma ótima alternativa para superar a escassez de
885 mão de obra no setor vitícola. Este sistema de condução, além de ser
886 totalmente mecanizável, traz qualidade de frutos e diversas vantagens
887 produtivas. Sendo a cultivar BRS Magna de melhor desempenho neste sistema
888 de condução dentre as estudadas na região do Vale do Rio do Peixe – SC.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AERNY, J. Définition de laqualité de lavendange. *Revue Suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture, Nyon*, v. 17, n. 4, p. 219-223, 1985.

ALMEIDA, H.A. Relação entre radiação fotossinteticamente ativa e a global no agroecossistema cacau. **The Journal of the Japanese Orthopaedic Association**, v. 73, n. 3, p. S661, 1999.

ALMEIDA, M. D. S.; NUNES, S. **Caracterização da composição físico-química de suco de uva ‘ BRS Cora ’ do Sub- médio do Vale do São Francisco , obtido a partir de uvas cultivadas em diferentes sistemas de condução : quarto ciclo de produção.** p. 197–201, 2018.

AMARANTE, V.T. C. DO; ZANARDI O.Z. , MIQUELOTO A.; STEFFENS C.A. , ERHART J. , ALMEIDA J.A. Quantificação da área e do teor de clorofilas em folhas de plantas jovens de videira "Cabernet Sauvignon" mediante métodos não destrutivos. **Rev. Bras. Frutic.**, Jaboticabal-SP, p. 680–686, 2009.

ANTONIO,R.; SOZIM, M.; MALGARIM, M.Universidade Federal do Paraná Número completo. **Diferents Prune Efect in Vine grapes Negrapes CV .** Vênus Production. 2007.

BARBOSA JÚNIOR, R.; SILVA, S. F. da; VITOR, J. P. F.; LEAO, P. C. de S. Caracterização fenológica de genótipos de uvas de mesa do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido. Petrolina: **Embrapa Semiárido.** p. 179-186. 2011.

BARTSCH T. The cost of canep pruning in a VSP canopy. **The Australian and New Zealand Grape growerand Winemaker** 558: 34-36. 2010.

BATISTA, F. da S.L.; OLIVEIRA, J.B. de; VASCONCELOS, G.B.N.; BORGES, R.M. E.; BIASOTO, A.C.T.; PEREIRA, G.E. Influência de porta-enxertos sobre a composição do suco da uva ‘Isabel Precoce’ elaborado no Vale do Submédio do São Francisco. Bento Gonçalves. Anais. Bento Gonçalves: **Embrapa Uva e Vinho**, 2012. p.5139-5142.

BLANKENSHIP, R. E. Fotossíntese: As Reações Luminosas. In: TAIZ, L. & ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal.** 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. p.147-181.

BERGQVIST, J.; DOKOOZLIAN, N.; EBISUDA, N. Sunlight Exposure and Temperature Effects on Berry Growth andComposition of Cabernet Sauvignon and Grenache in the Central San Joaquin Valley of California. **American Journal of Enology and Viticulture**, Davis, v. 52, n. 1, p. 1-7, 2001.

BENDER, A., SOUZA, A. L. K., CALIARI, V., SOUZA, E. L., MALGARIM, M. B., & CAMARGO, S. S. Physico chemical characteristics of whole grape juice selaborated from *Vitis rotundifolia* species. **Brazilian Journal of Food Technology**, 22, e 2018310. 2019.

BENDER, A., SOUZA, A. L. K.,, SOUZA, E. L., MALGARIM, M. B., & CAMARGO, S. S. Caracterização físico-química e sensorial de sucos da uva Isabel em cortes com diferentes variedades produzidas na região do Vale do Rio do Peixe-SC. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 23, p. 1–11, 2020.

BENDER, A., MALGARIM, M. B., SOUZA, A. L., CALIARI, V, COSTA, V.B. Potencial de produção de uvas e sucos na região do Vale do Rio do Peixe - SC: Avaliação de variedades de técnicas de processamento. Universidade **Federal de Pelotas**. 2021

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Plano nacional de desenvolvimento da fruticultura**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. **Instrução normativa nº 14, de 8 de fevereiro de 2018**. Estabelece a complementação dos padrões de identidade e qualidade do vinho e derivados da uva e do vinho. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 mar. 2018. Seção 1, p. 4-6.

BRESOLIN, B.; GULARTE, M.A.; MANFROI, V. Água exógena em suco de uva obtido pelo método de arraste a vapor. **Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial**, Ponta Grossa, v. 07, n. 01; p. 922-933, 2013.

BURIN, V. M., FALCÃO, L. D., GONZAGA, L. V., FETT, R., ROSIER, J. P., & BORDIGNON-LUIZ, M. T. (2010). Colour, phenolic content and antioxidant activity of grape juice. **Food Science and Technology** (Campinas), 4(30), 1027-1032.

BRITO, M.; DA ROSA BORGES, G. FATORES QUE INFLUENCIAM NA COMPRA DO SUCO DE UVA. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 10, n. 2, 3 mar. 2020.

BRUCH, K. L. **Nem tudo que tem uva é suco Bento Gonçalves**: IBRAVIN, 2012. 12 p.

BUSATO, C. C. M.; SOARES, A. A.; MOTOIKE, S. Y.; BUSATO, C. Fenologia e exigência térmica da videira 'Niágara Rosada' cultivada no Noroeste do Espírito Santo. **Revista Trópica: Ciências Agrárias e Biológicas**, v. 7, n. 2, 2013.

CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G. **BRS CORA Nova Cultivar de Uva para**

- Suco, Adaptada a Climas Tropicais.** Comunicado técnico nº 53. Bento Gonçalves, RS. 1º edição, Jul. 2004.
- CAMARGO, U. A.; MAIA, J. D. G.; RITSCHER, P. S. **Cultivares de videira para processamento.** Produção integrada de uva para o processamento: implantação do vinhedo, cultivares e manejo da planta, v. 3, p. 25–40, 2015.
- CAMARGO, U.A.; TONIETTO J., HOFFMANN, A. Progressos na viticultura brasileira. In: **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal – SP. Vol. Especial 144-149. Out. 2011.
- CAMILO, J. P. S. Poda Mecânica vs Poda Manual na Casta Touriga Nacional na Região do Dão. Lisboa, 62f., Lisboa, Portugal, 2009.
- CARPIO, C. E.; SAFLEY, C. D.; POLING, E. B. Estimated Costs and Investment Analysis of Producing and Harvesting Muscadine Grapes in the Southeastern United States. **Hort technology**, v.18, n.2, p. 308 – 3017, 2008.
- CASTILHOS, M. B. M.; MAIA, J. D. G.; GÓMEZALONSO, S.; DEL BIANCHI, V.L.; HERMOSÍNGUTIÉRREZ, I. Sensory acceptance drivers of prefermentation de hydration and submer gedcapredwin es produced from Vitis labrusca hybrid grapes. **LWT - Food Science and Technology**, v.69, n.1, p.82-90, 2016.
- CHAVES, E.S. Influência do sistema de condução do vinhedo no índice de polifenóis totais, teor de antocianinas e intensidade de cor de uvas cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.). In: **Universidade Federal de Santa Catarina**. Florianópolis 2005.
- CEPA. **Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina.** Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, v. 53, n. 9, p. 287, 2018.
- CHIAROTTI, F, GUERIOS, IT, CUQUEL, FL, BIASI, L A. Melhoria da qualidade de uva 'Bordô' para produção de vinho e suco de uva. **Rev. Bras. Frutic.**; Volume Especial (E); 618-624, 2011.
- CHOUDHURY, M. M. (Ed.). **Uva de mesa: pós-colheita** (Vol. 12, 55 p., Série Frutas do Brasil). Brasília: Embrapa Informação Tecnológica; Petrolina-PE: Embrapa Semiárido. 2001.
- COELHO, P. Breve Histórico Da Vitivinicultura E a Sua Evolução Na Região Semiárida Brasileira. **Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agrônômica**, v. 7, p. 81–85, 2010.

COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC. **Manual de adubação e de calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina**. 10. ed. Porto Alegre; Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Núcleo Regional Sul; Ed. UFRGS, 2004.

CONNER, P. J. Performance of Muscadine Grape Cultivars in Southern Georgia. **Journal of the American Pomological Society**, Georgia, USA. Vol. 63, p. 101-107, 2009.

COPELLO, M, Relatório da safra, os números de 2016. **Anuário Vinhos do Brasil**, Bento Gonçalves, p. 32-35, 2017.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL – DERAL. **Prognóstico 2020**. Fruticultura análise da Conjuntura. 2020.

FERRER-GALLEGO, R.; GARCÍA-MARINO, M.; HERNÁNDEZ-HIERRO, J. M.; RIVAS-GONZALO, J. C.; ESCRIBANO-BAILÓN, M. T. Statistical correlation between flavanolic composition, colour and sensorial parameters in grape seed during ripening *Analytica Chimica Acta*, **Bethesda**, v.660, n.1, p.22-28, 2010.

FINCH, D. A.; BAILEY, W. G.; MCARTHUR, L. J. B.; NASITWITWI, M. Photosynthetically active radiation regimes in a southern African savanna environment. **Agricultural and Forest Meteorology**, v.122, p.229-238, 2004.

FONTES, P. C. R. **Diagnóstico do estado nutricional de plantas**. Viçosa, MG: UFV, 2001. 122 P.

FONSECA, D. P. Bourdeaux wine connection. **A vindima**: nos bastidores da colheita da uva. 25 setembro 2015.

GIL, GF; PSZCZÓLKOWSKI, P. **Viticultura: Fundamentos para otimizar a produção e a qualidade**. Chile: Edições Universidad Católica de Chile, 2007. 535p.

GUIMARÃES, C.; VIEIRA, H. J.; BACK, A. J.; SILVA, A. L. Fluxos De Radiação Solar Global Em Vinhedos De Altitude De São Joaquim-Sc. **Rev. Bras. Frutic**, v. 35, n. 3, p. 722–729, 2013.

GRIFONI, D., CARRERAS, G., ZIPOLI, G., SABATINI, F., DALLA MARTA, A., ORLANDINI, S. Roworientation effect on UV-B, UV-A and PAR solar irradiation components in vine yard Sat Tuscany, Italy. **Int Biometeorol**, 2008.

HERNANDES, J. L.; PEDRO M. J.; CONSTANTINO. J. G. ROLIM B. G. S.Comportamento produtivo de videira 'Niagara rosada' em diferentes sistemas de condução, com e sem cobertura plástica, durante as safras de inverno e verão. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 35, n. 1, p. 123-130, 2013.

HERNANDES, J. L.; MÁRIO J.; PEDRO J.; FERNANDES, M., Fernandes **Vantagens e limites dos principais sistemas de condução de videiras utilizados no Brasil**. p. 22–27, 2019.

HICKEY, C.C.; KWASNIEWSKI, M.T.; WOLF, T.K. Lea fremo Val effect son Cabernet Franc and Petot Verdot. II. Grape carotenoids, phenolics, and wine sensory analyses. **American Journal Enology and Viticulture**, v.69. p. 231-246, 2018.

HIDALGO, L. **Poda de la vid**. 6ª ed. Madri: Mundi-Prensa. 2003.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. **Levantamento Sistemático da Produção Agrícola**. 2018.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (São Paulo). Métodos físico-químicos para análise de alimentos /coordenadores Odair Zenebon, Neus Sadocco Pascuet e Paulo Tiglea -- São Paulo: **Instituto Adolfo Lutz**, 2008 p. 1020, 2008.

INTRIERI, C.; PONI, S. Integrated evolution of trellis training systems and machinesto improve grape quality and vintage quality of mechanized Italian vineyards. **American Journal of Enology and Viticulture**, v.46, n.1, p.116-127, 1995.

JONES, G. V., DAVIS, R.E..Climate influences on grape vine phenology, grape composition, and wine production and quality for Bordeaux, France. **Am. J. Enol. Vitic**. 666 51, 249–261. 2000.

KELLER, M. The Science of Grape vines. **Journal of Chemical Information and Modeling** (Vol. 440 53). 2020.

KELLER, M.; MILLS, L.J.; WAMPLE, R.L.; SPAYD, S.E. Crop load managementin Concord grapes using different pruning techniques. **American Journal of Enology and Viticulture**, v.55, p.35–50, 2004.

KÖPPEN, W. Grundris der Klimakunde. Berlin: **Walter de Gruyter**, 1931. 390p.

LEÃO, P.C. de S.; LACOURT, R. B. A Viticultura no Semiárido Brasileiro. Embrapa. Manejo da copa, 2009.

LEÃO, P.C.S.; POSSÍSIO, E. L. **Histórico da videira.** In: Leão, P.C.S. & Soares, J.M.(Org.). A viticultura no semiárido brasileiro. Petrolina. Embrapa Semi-Árido. p.13–17, 2000.

MAIA, J.D.; CAMARGO, U.A. Sistemas de Produção de Uvas Rústicas para Processamento em Regiões Tropicais do Brasil. **Embrapa Uva e Vinho. Sistema de Produção**, 9 ISSN 1678-8761, 2005.

MANDELLI, F.; BERLATO, M. A.; TONIETTO, J.; BERGAMASCHI, H. Fenologia da videira na Serra Gaúcha. **Pesquisa Agropecuária Gaúcha**, v. 9, n. 1/2, p. 129-144, 30 dez. 2003.

MANFROI, L.; MIELE A. , RIZZON L. A., BARRADAS, C..Composição química do mosto da uva “cabernet franc” conduzida no sistema lira aberta. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 30, n. 4, p. 787–792, 2006.

MARZAROTTO, V. **Suco de Uva.** In: FILHO, W.G.V. Bebidas não alcoólicas: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Edgard Blücher, v.2, 2010.

MATTAR, G.S. Produtividade, qualidade da uva e do vinho da videira SR 501-17 sobre diferentes porta-enxertos cultivada no estado de São Paulo. **Instituto Agrônomo de Campinas**, Campinas, p.101, 2016.

MCCREE, K. J. Test of current definitions of photo synthetical lyactiver adiation agains tleaf photo synthesis data. **Agricultural Meteorology**, v.10, p.443-53, 1972.

MCGOVERN, P.E. Ancientwine: the search for the origin of viniculture. Princeton. **Princeton University Press**. 2003.

MELLO, L. M. R. DE. **Comunicado 121** Técnico. n. Figura 1, p. 1–8, 2012.

MELLO, L. M. R. DE; MACHADO, C. A. E. Vitivinicultura brasileira : Panorama 2019. **Embrapa Uva e Vinho-Comunicado Técnico** (INFOTECA-E), v. 214, p. 1–21, 2020.

MENDONÇA, T. R.; MOTA, R. V.; SOUZA, C. R.; DIAS, F. A. N.; PIMENTEL,

R. M. A.; REGINA, M. A. Manejo da poda da videira Chardonnay em região de altitude no Sudeste Brasileiro. **Bragantia**, v.75, n.1, p.57- 62, 2016.

MIELE, A.; MANDELLI, F. Sistemas de condução da videira. Brasília, DF: **Embrapa Uva e Vinho**, 2005.

MIELE, A.; MANDELLI, F. Sistemas de condução da videira. 2014.
MONTEITH, J.L. Solar radiation and productivity in tropical eco systems. **Journal of Applied Ecology**, v.9. p.747- 766, 1972.

MIELE, A.; MANELLI, F. Uvas Viníferas para Processamento em Regiões de Clima Temperado. In: **EMBRAPA, Sistema de Produção**, 2003.

MIRANDA, J. DE; LIMA A., FORLIN C., COTTICA D., Características Microclimáticas No Comportamento Agrônômico E Qualitativo De Uvas 'Isabel Precoce' Em Diferentes Sistemas De Condução Em Santa Tereza Do Oeste-Pr. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p., 2020.

MORRIS, J.R.; STRIEGLER, R.K. Grape juice: Factors that influence quality, processing technology, and economics, p.585–616. In: **D.M. Barrett, L. Somogyi**, 2005.

MULLINS, M.G.; BOUQUET, A.; WILLIAMS, L.E. Biology of the grapevine. Cambridge: **University Press**. 239p. 2000.

NODARI, E. S.; MORETTO, S.E.; PERUCHI, S. Entre florestas e parreirais: a vitivinicultura no Alto Vale do Rio do Peixe/SC. In: **História Ambiental e Migrações: Diálogos**. São Leopoldo: Oikos; Chapecó: UFFS Ed., 2017.

NORBERTO, P. M. et al. Efeito do sistema de condução em algumas características eco- fisiológicas da videira (*Vitis labrusca* L.). **Ciência e Agro - tecnologia**, v. 33, n. 3, p. 721-726, 2009.

NORBERTO, P.M.; REGINA, M. de A.; CHALFUN, N.J.; SOARES, A.M.; FERNANDES, V.B. Influência do sistema de condução na produção e na qualidade dos frutos das videiras folha de figo e niagra rosada em caldas, MG. In: **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 32, n. 2, p. 450-455, mar./abr., 2008.

OLIVEIRA, M. E. B.; GUERRA, N. B.; MAIA, A. H. N.; ALVES, R. E.; MATOS, N. M. S.; SAMPAIO, F. G. M.; LOPES, M. M. T. Características químicas e físico-químicas de pequis da Chapada do Araripe, Ceará. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 32, n. 1, p. 114-125, 2010.

OIV. Actualidad de la coyuntura del sector vinícola mundial en 2020.

Actualidad de la coyuntura del sector vinícola mundial en 2020, p. 2–18, 2021.

PANCERI, C.P.; FAGHERAZZI, M.M.; CANOSSA, A.T.; MACHADO, B.D.; BRINGHETI, A.F.; BRIHENTI, E. Cordão esporonado X Guyot: Influência da intensidade de poda sobre os aspectos produtivos e qualitativos da uva chardonnay em região de altitude de Santa Catarina. **Revista da 15a Jornada de Pós graduação e Pesquisa**. IS. Congrega Urcamp, vol. 15, nº15, ano 2018.

PEDRO JÚNIOR MJ. Indicação da época de pulverização para controle de doenças fúngicas em videira, cv. Niágara rosada, baseada em sistema fenológico- pluviométrico. **Revista Brasileira de Agrometeorologia** 7: 235-2427. 1999.

PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. **Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas**. 2002.

PEREIRA, E. G.; TONIETTO, J.; ZANUS, M. C.; SANTOS, H. P. Vinhos no Brasil: contrastes na geografia e no manejo das videiras nas três viticulturas do país. **Embrapa Uva e Vinho**, p. 22, 2020.

PEREIRA, E.G.; CONCEIÇÃO, M.A.; DUTRA, M.C, LIMA, M dos S. Características físico-químicas de sucos de uvas de vinhedos conduzidos em espaladeira e latada. In: **Revista Brasileira de Viticultura e Enologia**, n.10, p.110-116, 2018.

PONI, S.,BERNIZZONI, F., PRESUTTO, P., REBUCCI, B. Performance of Croatia under short cane mechanical hedging: A success fulcase of adaptation. **American Journal of Enology and Viticulture**, 55, pp.379-388. 2004.

PÖTTER, G. H.; DAUDT E. C.; BRACKMANN A.; LEITE T.T.; PENNA N G. - Partial de foliation on vines and its effects on Cabernet Sauvignon grapes and wines from the southwest of Rio Grande . **Ciência Rural**, v. 40, n. 9, p. 2011–2016, 2010.

POTTER, R.O.; CARVALHO, A.P.; FLORES, C.A.; OGNOLA I. Embrapa, 2004. **Solos de Santa Catarina**. Bol. Pesqui. e Desenvolv. 46, 1–745.

QUEIROZ-VOLTAN, R. B. Variações na anatomia foliar de videira Niágara em diferentes sistemas de condução. In: **Ciência e Agrotecnologia**, v. 32, n. 2, p.

450-455, 2008. *Bragantia*, v. 70, n. 3, p.488-493, 2011.

RAMOS, A.R.; FELISBERTO A. de C.; TIMOSSI, P.C.; COSTA, A.P. Características agronômicas da mucuna-preta em diferentes épocas de sementeira. In: **Revista de Ciências Agrárias** vol.41 no.4 Lisboa dez. 2018.

REISCH, B.I.; PRATT, C. Grapes. In: Janick, J. & Moore, J.N. (Ed.). *Fruit breeding: vine and small fruits*. **New York John Wiley**. 1996. v.2. pp.297–370.

REYNOLDS, A.G; HEUVEL, J.E.V. Influence of grape vine training systems on vine growth and fruit composition: a review. **American Journal of Enology and Viticulture**, Davis, n.60, p.251-268, 2009.

RITSCHHEL, P.; MAIA, J.D.; CAMARGO, U.A.; ZANUS, M.C.; SOUZA, R.T.; FAJARDO, T.G.M. 'BRS Magna' nova cultivar de uva para suco com ampla adaptação climática. Bento Gonçalves: **Embrapa Uva e Vinho**, 2012. (Comunicado Técnico, 53).

RITSCHHEL, P.S.; MAIA, J.D.; SOUZA, R.T. Novas cultivares brasileiras de uvas para mesa e para elaboração de sucos. In: **Synergis muss cyentifica UTFPR**, Pato Branco, v. 13, n. 1, p. 34–37, 2018.

RIZZON, L.A.; MENEGUZZO, J. **Suco de Uva**. In: Embrapa Informação Tecnológica, 2007. 45 p.; il. – (Coleção Agroindústria Familiar).

RIZZON, L. A., MENEGUZZO, J., & MANFROI, V. Elaboração de suco de uva na propriedade vitícola. (Documentos, 21). Bento Gonçalves: **EMBRAPA Uva e Vinho**. 1998.

ROBASKEWICZ, F., DAMBRÓS, B. P., & SANTIN, N. C. Determinação do teor de polifenóis totais e outras características físico-químicas em sucos de uva comerciais. **Unoesc & Ciência**, 7, 159-166. 2016.

RODRIGUES, M. P. Caracterização físico-química de vinhos elaborados com uvas Gewürztraminer provenientes de colheita manual e mecanizada. 59f. - **Universidade Federal do Pampa**, Dom Pedrito, 2015.

SATO, A. J. et al. Phenology and physicochemical and productive characterization of the "Brs Carmem" vine produced in western Paraná. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v. 20, n. 4, p. 286–293, 2021.

SILVA, E. R. Produção de uvas de mesa – Fazenda hidrotec agrícola LTDA. In: Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns. **Garanhuns**, 2018. 38 f.

SILVA, G.G.; NASCIMENTO, R.L.; OLIVEIRA, V. de S.; ARAÚJO, A.J. de B.; OLIVEIRA, J.B.; PEREIRA, G.E. Características físico-químicas de sucos de uvas 'Isabel Precoce' e 'BRS Violeta' elaborados no Nordeste do Brasil. In: **Jornada de iniciação científica da EMBRAPA semiárido**, 6., Petrolina. Anais: Embrapa Semiárido, 2011. p. 353-359. Documentos, 238. 2011.

SÔNEGO, O.R.; GARRIDO, L.R.; GRIGOLETTI JÚNIOR, A. **Principais doenças fúngicas da videira no Sul do Brasil**. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho. 32p., 2005.

SOUZA, A. L. K. DE; CAMARGO S. S., SOUZA E.L., PASA M. S., COSTA V. B. Desempenho inicial de uvas americanas conduzidas em sistemas de conduções adaptados a poda e colheita mecanizada. **Revista da Jornada da Pós Graduação e Pesquisa - CONGREGA**, 2017.

SOUZA, J.S.I. **Uvas para o Brasil**. Piracicaba. FEALQ.1996.

STREIT, N.M.; CANTERLE, L.P.; CANTO, M.W.; HECKTHEUER, L.H.H. As clorofilas. **Ciência Rural**, v.35, n.3, p.748-755, 2005.

SWIADER, J. M; MOORE, A. SPAD-chlorophyll response to nitrogen fertilization and evaluation of nitrogen status in dry and irrigated pumpkins. **Journal of Plant Nutrition**, v. 25, p. 1089-1100, 2002.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal**. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 819p.

TEIXEIRA, A.H.C. **Cultivo da Videira**. Embrapa Semi-Árido, 2004. (Sistemas de produção, n.1).

TERRA, M. M.; POMMER, C. V.; PIRES, E. J. P.; RIBEIRO, I.J.A.; GALLO, P.B.; PASSOS, I.R.S. Produtividade de cultivares de uvas para suco sobre diferentes porta-enxertos IAC em Mococa-SP. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.23, n.2, p.382-386. 2001.

TOBERGTE, D. R.; CURTIS, S. Quantum meter. **Journal of Chemical Information and Modeling**, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2013.

USP, E. **Viticultura**. 2021.

WÜRZ, D. A. ; MARCON, J.L.; ALLEBRANDT; BEM B. P.; RUFATO L.; KRETZSCHMAR A. Desempenho agrônômico da videira Cabernet Sauvignon

em diferentes sistemas de condução em regiões de elevada altitude de Santa Catarina, Brasil. **Revista de Ciências Agroveterinárias**. n. 1. 2019

WÜRZ, D. A.; MARCON, J.L.; ALLEBRANDT, R.; RUFATO, L. Evaluation of bud fertility from grape vine varieties cultivate dinhigh altitude region of Santa Catarina. **Revista de Ciencias Agroveterinarias**,v. 18, n.1,p. 81–86,2019.

WÜRZ, D.A.; MARCON, J.L.; ALLEBRANDT, R.; RUFATO, L. Ações do Laboratório de Viticultura e Enologia da Udesc Lages no desenvolvimento da vitivinicultura de altitude de Santa Catarina. In: **Revista de Extensão do IFSC**. Ano 04, n. 7, jul./dez. 2017.

WÜRZ, D. A. .; MARCON, J.L.; ALLEBRANDT, R.; RUFATO, L. Dinâmica temporal da podridão cinzenta (*Botrytis cinerea*) na videira Cabernet Franc em função do aumento da carga de gemas.**Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e27810918108, 2021.

WÜRZ, D. A.; MARCON, J.L.; ALLEBRANDT, R.; RUFATO, L. Phenology and maturation of “Cabernet Franc” grape vine due to differen tretained nodes number in high altitude region of Santa Catarina State. **Revista de Ciencias Agroveterinarias**,v.18,n.4,p.459–465,2019.

WÜRZ, D.A.;.Semi mechanized shoottoppingasan alternative for work force optimization and reduction of operational costsof Summer pruning management of grape vines. **Revista de Ciencias Agroveterinarias**, v. 17, n.3,p. 440–443,2018.

WÜRZ, D. A.; BONNI B. F.; BRIGHENTI, A. F.; CANOSSA, A. T. ; ALLEBRANDT, R. BEM B. P., RUFATO. L. KERTZSCHMAR A. A. Effect of retained node numbers of Cabernet Franc grapevine on the interception of solar radiation and on the node fertility. **Revista de Ciencias Agroveterinarias**, v. 18, n. 4, p. 453–458, 2019.

VIDEIRAS, C. M. DE. Colheita Mecanizada de Videiras. 2021.

VILLANUEVA, N. D. M.; PETENATE, A. J.; SILVA, M. A. A. P da. Perfomance of hibrid hedonic scale as compared to the radition al hedonic, self-adjustin gand ranking scales. **Food Quality and Preference**, Oxford, v.16, n. 8, 691-703, 2005.

YUAN, Z., CAO, Q., ZHANG, K., ATA-UI-KARIM, S. T., TIAN, Y., ZHU, Y., LIU, X. Optimalle af positions for SPAD meter measurement in rice. **Frontiers in plants cience**, 7, 719, 2016.

ZABADAL, T.J.; VANEE, G.R.; DITTMER, T.W.; LEDEBUHR, R.L. Evaluation of strategies for pruning and crop control of Concord grapevines in southwest Michigan. **American Journal of Enology and Viticulture**, v.53, p.204–209, 2002.

ZANUS, M.C. PANORAMA DA VITIVINICULTURA BRASILEIRA. In: XV Congresso Latino-Americano de Viticultura e Enologia. Bento Gonçalves-RS, 3 a 7 de novembro de 2015. p. 217-219.